

# Abiral 500 mg, tabletki powlekane, 60 tabl. PROGRAM LEKOWY

Cena: 10 546,88 zł

## Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	+PHARMA ARZNEIMITTEL GMBH
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Lek na receptę

## Opis produktu

### Abiral 500 mg, tabletki powlekane Abirateroni acetas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceutycie. Patrz punkt 4.

1. Co to jest lek Abiral i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Abiral
3. Jak stosować lek Abiral
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Abiral
6. Zawartość opakowania i inne informacje

## 1. Co to jest lek Abiral i w jakim celu się go stosuje

Abiral jest lekiem zawierającym abirateronu octan. Jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka gruczołu krokowego z przerzutami do innych części ciała. Abiral hamuje wytwarzanie testosteronu w organizmie; to może spowolnić rozwój raka gruczołu krokowego - prostaty.

Gdy lek Abiral jest stosowany na wczesnym etapie choroby reagującej na terapię hormonalną, jest on podawany razem z terapią zmniejszającą stężenie testosteronu (terapia supresji androgenowej).

W trakcie stosowania tego leku lekarz prowadzący zaleci także stosowanie innego leku o nazwie prednizon lub prednizolon. Ma to na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia nadciśnienia tętniczego krwi, gromadzenia nadmiaru wody w organizmie (zastoju płynów) lub zmniejszenia stężenia potasu we krwi.

## 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Abiral

### Kiedy nie stosować leku Abiral

- jeśli pacjent ma uczulenie na abirateronu octan lub którykolwiek z pozostałych składników leku

(wymienionych w punkcie 6)

- u kobiet, szczególnie w ciąży. Lek Abiral stosuje się wyłącznie u mężczyzn.

- jeśli pacjent ma ciężkie uszkodzenie wątroby

- w skojarzeniu z lekiem Ra-223 (stosowanym w leczeniu raka gruczołu krokowego)

Nie należy stosować tego leku, jeśli którakolwiek powyższa

sytuacja dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- ? jeśli pacjent ma problemy z wątrobą
- ? jeśli pacjent ma nadciśnienie, niewydolność serca lub niskie stężenie potasu we krwi (niskie stężenie potasu we krwi może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzenia rytmu serca)
- ? jeśli pacjent miał inne choroby serca lub naczyń krwionośnych
- ? jeśli pacjent ma nieregularny lub przyspieszony rytm serca
- ? jeśli pacjent ma duszność
- ? jeśli masa ciała pacjenta zwiększyła się w krótkim czasie
- ? jeśli pacjent ma obrzęk stóp, kostek lub nóg
- ? jeśli pacjent przyjmował w przeszłości lek ketokonazol w leczeniu

raka gruczołu krokowego

- ? konieczność przyjmowania tego leku z prednizonem lub

prednizolonem

- ? możliwość wystąpienia działań niepożądanych dotyczących

kości

- ? jeśli pacjent ma duże stężenie cukru we krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma jakiegokolwiek

zaburzenia serca lub naczyń krwionośnych,

w tym zaburzenia rytmu serca (arytmia) lub stosuje leki na te

zaburzenia.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma zażółcenie skóry lub

oczu, ciemny mocz, ciężkie nudności lub

wymioty, które mogą być objawami zaburzeń czynności wątroby.

Rzadko może wystąpić niewydolność

wątroby (nazywana ostrą niewydolnością wątroby), która może

prowadzić do zgonu.

Może wystąpić zmniejszenie liczby czerwonych krwinek,

zmniejszenie popędu płciowego, osłabienie mięśni

i (lub) ból mięśni.

Lek Abiral nie może być podawany w skojarzeniu z Ra-223 z

powodu możliwego zwiększenia ryzyka

złamań kości lub zgonu.

Jeśli pacjent ma zamiar przyjmować Ra-223 po terapii lekiem Abiral oraz prednizonem/prednizolonem, należy odczekać 5 dni zanim rozpocznie się leczenie Ra-223. W razie wątpliwości czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

**Badania krwi**

Abiral może wpływać na czynność wątroby, a pacjent może nie mieć żadnych objawów. Podczas stosowania leku lekarz prowadzący będzie okresowo zlecał badania krwi w celu sprawdzenia wpływu leku na wątrobę.

**Dzieci i młodzież**

Tego leku nie stosuje się u dzieci i młodzieży. Jeśli lek Abiral zostanie przypadkowo połknięty przez dziecko, należy niezwłocznie udać się do szpitala zabierając ze sobą ulotkę dla pacjenta, by pokazać ją lekarzowi na izbie przyjęć.

**Lek Abiral a inne leki**

Przed zazyciem jakiegokolwiek leku należy zasięgnąć porady u lekarza lub farmaceuty.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to ważne, gdyż Abiral może nasilać działanie wielu leków, w tym leków nasercowych, uspokajających, niektórych leków przeciwcukrzycowych, leków ziołowych (np. ziele dziurawca zwyczajnego) i innych. Lekarz może zmienić dawki tych leków. Również inne leki mogą zwiększać lub zmniejszać działanie leku Abiral. Może to skutkować działaniami niepożądanymi lub niewłaściwym działaniem leku Abiral. Supresja androgenowa może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca. Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent przyjmuje leki:

- stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron i sotalol)  
- mogące zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca [np. metadon (lek przeciwbólowy i stosowany w leczeniu uzależnień), moksycyflokscyna (antybiotyk), leki przeciwpsychotyczne (stosowane w ciężkich zaburzeniach psychicznych)].

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków.

Stosowanie leku Abiral z jedzeniem  
Leku nie wolno zażywać razem z jedzeniem (patrz punkt 3, „Jak stosować lek Abiral”).  
Zażycie leku Abiral z jedzeniem może powodować działania niepożądane.

### **Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność**

Leku Abiral nie stosuje się u kobiet. Lek może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku, jeśli jest przyjmowany przez kobietę w ciąży.

Jeśli pacjent odbywa stosunki płciowe z kobietą, która może zajść w ciążę, należy używać prezerwatywy lub innej skutecznej metody antykoncepcji.

Jeśli pacjent odbywa stosunki płciowe z kobietą będącą w ciąży, należy używać prezerwatywy, by chronić nienarodzone dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn  
Jest mało prawdopodobne, aby ten lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwanie narzędzi lub maszyn.

Lek Abiral zawiera laktozę i sól  
Abiral zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ten lek zawiera 23 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w dawce dobowej, składającej się z dwóch tabletek po 500 mg. Odpowiada to 1,2% maksymalnej zalecanej

dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.

### 3. Jak stosować lek Abiral

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

leku należy zażywać.  
Zalecana dawka to 1000 mg (dwie tabletki) przyjmowana raz na dobe.

Stosowanie leku

- Lek należy przyjmować doustnie.

- Lek Abiral nie wolno przyjmować razem z jedzeniem.

Lek Abiral należy przyjmować co najmniej jedną godzinę przed lub co najmniej dwie godziny po

jedzeniu (patrz punkt 2 „Stosowanie leku Abiral z jedzeniem”).

- Tabletki należy połykać w całości popijając wodą.

- Nie należy rozkruszać tabletek.

- Lek Abiral przyjmuje się razem z lekiem zawierającym prednizon lub prednizolon. Prednizon lub

prednizolon należy zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza.

- Prednizon lub prednizolon należy przyjmować codziennie podczas stosowania leku Abiral.

- Ilość stosowanego prednizonu lub prednizolonu może być zmieniona w razie nagłej potrzeby. Lekarz

prowadzący poinformuje pacjenta, jeśli zajdzie konieczność zmiany dawki przyjmowanego

prednizonu lub prednizolonu. Nie należy przerywać zażywania prednizonu lub prednizolonu bez

konsultacji z lekarzem.

Lekarz prowadzący może przepisać także inne leki pacjentowi, który przyjmuje lek Abiral i prednizon lub prednizolon.

### Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Abiral

Jeśli pacjent zażyje więcej leku niż powinien zżyć, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem

prowadzącym lub udać się do szpitala.

### Pominięcie zastosowania leku Abiral

Jeśli pacjent zapomni zażyć lek Abiral bądź prednizon lub prednizolon, należy zażyć zwykłą dawkę następnego dnia.

Jeśli pacjent zapomni zażyć lek Abiral bądź prednizon lub prednizolon przez okres dłuższy niż jeden dzień, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

#### **Przerwanie stosowania leku Abiral**

Nie należy przerywać zazywania leku Abiral bądź prednizonu lub prednizolonu bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

#### **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Należy przerwać zazywanie leku Abiral i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent zauważy którykolwiek z objawów:

- osłabienie siły mięśni, drżenie mięśni lub kołatanie serca (palpitacje). Mogą być to objawy małego

stężenia potasu we krwi.

#### **Inne działania niepożądane**

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

Barzduki nóg lub stop, niskie stężenie potasu we krwi, podwyższone wyniki testów czynnościowych wątroby, wysokie ciśnienie tętnicze, zakażenia dróg moczowych, biegunka.

Często (mogą występować u najwyżej 1 na 10 pacjentów)

wysokie stężenie lipidów we krwi, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków), niewydolność serca, szybki rytm serca, ciężkie zakażenie - posocznica (sepsa), złamania kości, niestrawność,

krw w moczu, wysypka.

Niezbyt często (mogą występować u najwyżej 1 na 100 pacjentów):

zaburzenia czynności nadnerczy (związane z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej),

nieprawidłowy rytm serca (arytmia), osłabienie mięśni i (lub) ból mięśni.

Rzadko (mogą występować u najwyżej 1 na 1000 pacjentów) podrażnienie płuc (zwane także alergicznym zapaleniem pęcherzyków płucnych), ostra niewydolność

watrobę.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

zawał serca, zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QT) oraz ciężkie reakcje alergiczne, powodujące trudności

z przełykaniem lub oddychaniem, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, lub swędząca wysypka.

U mężczyzn leczonych z powodu raka gruczołu krokowego może wystąpić utrata masy kostnej.

Lek Abiral w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem może nasilać to działanie.

### **Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutyce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie

zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

### **5. Jak przechowywać lek Abiral**

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i

niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności



zamieszczonego na pudełku tekturowym lub blistrze po „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Ten lek nie wymaga szczególnych warunków przechowywania. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## 6. Zawartość opakowania i inne informacje

Substancją czynną leku jest abirateronu octan. Każda tabletki powlekana zawiera 500 mg abirateronu octanu.  
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna typ 102, kroskarmeloza sodowa, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, hypromeloza (typ 2910), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan (patrz punkt 2 „Lek Abiral zawiera laktozę i sól”).  
Otoczka tabletki zawiera: żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), kopolimer szczepiony makroglu i alkoholu poli(winylowego), talk i tytanu dwutlenek (E 171).

### Jak wygląda lek Abiral i co zawiera opakowanie

Lek Abiral występuje w postaci owalnych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych w kolorze fioletowym, z wytłoczonym oznakowaniem „500” po jednej stronie tabletki i gładką drugą stroną tabletki.

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium pakowane w tekturowe pudełka zawierające 56 lub 60 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

### Podmiot odpowiedzialny

+pharma arzneimittel gmbh  
Haflnerstraße 211  
8054 Graz  
Austria

**Wytwórca**  
Haupt Pharma Münster GmbH  
Schleebriuggenkamp 15  
48159 Münster  
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących  
tego leku należy zwrócić się do  
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

+pharma Polska sp. z o.o.  
ul. Podgórska 34  
31-536 Kraków  
Polska  
tel: +48 12 262 32 36  
e-mail: [krakow@pluspharma.eu](mailto:krakow@pluspharma.eu)