

Azulan, płyn do stosowania na skórę i błony śluzowe, 30 g

Cena: 5,98 zł



Opis słownikowy

Postać	Płyn
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	"Wrocławskie Zakłady Zielarskie ""Herbapol"" S.A."
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Produkt leczniczy Azulan® zawiera wyciąg płynny z kwiatu rumianku (1:2), jest płynem do stosowania doustnego, na skórę i błony śluzowe.

Preparat ma właściwości przeciwzapalne, stosowany wewnętrznie działa również rozkurczająco na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego (działanie wiatropędne).

Wskazania do stosowania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany:

Zewnętrznie – w stanach zapalnych skóry i błon śluzowych m.in. do płukania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła oraz w stanach zapalnych dziąseł.

Wewnętrznie – w stanach skurczowych przewodu pokarmowego jako pomocniczy środek rozkurczający, wiatropędny i przeciwzapalny w stanach zapalnych przewodu pokarmowego.

Jest to tradycyjny produkt leczniczy roślinny przeznaczony do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Jak stosować Azulan

- **Zewnętrznie:**

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 10% roztwór wodny do płukania i okładów (1 cz. Azulanu + 9 cz. przegotowanej, chłodnej wody).

- **Wewnętrznie:**

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia doustnie 5 ml (1 łyżeczka) w ½ szklanki wody przed posiłkiem do 3 razy dziennie.

Jeśli po upływie tygodnia nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki:

Nie opisano przypadków przedawkowania przy podawaniu wewnętrznym i zewnętrznym.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Azulan:

Należy przyjąć kolejną dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Nie należy stosować preparatu jeśli występuje uczulenie na kwiaty rumianku lub inne rośliny z rodziny Złożonych (Compositae / Asteraceae).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:

Lek zawiera 60 – 68 % v/v etanolu. Jedna dawka = 5 ml zawiera ok. 2,58 g etanolu.

Ze względu na zawartość etanolu, lek może działać szkodliwie u osób z chorobą alkoholową, a także u osób ze schorzeniami wątroby lub padaczką.

Stosowanie leku Azulan u dzieci:

Ze względu na zawartość etanolu, nie należy stosować preparatu u dzieci do lat 12.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ze względu na zawartość etanolu w preparacie stosowanie leku w tym okresie nie jest zalecane.

Wpływ na płodność nie jest znany. Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Preparat zawiera 60 – 68 % v/v etanolu.

1 dawka (5 ml) zawiera ok. 2,58 g etanolu.

Zażycie wewnątrznie produktu może spowodować osłabienie zdolności psychofizycznych.

Nie zaleca się przyjmowania wewnątrznie leku przed podróżą, alkohol zawarty w preparacie może zostać wykryty przez urządzenia do wykrywania alkoholu w powietrzu wydychanym.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek Azulan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Azulan mogą wystąpić:

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, pokrzywka, świąd skóry, rumień, obrzęk, zwiększona wrażliwość na promieniowanie słoneczne – częstość nieznana.
- zaburzenia układu immunologicznego: szok anafilaktyczny, astma – częstość nieznana.

Częstość nieznana – nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Przechowywanie leku Azulan

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25° C.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności.

Skład

- 1 ml (co odpowiada 0,915 g) produktu zawiera:
- 1 ml wyciągu płynnego z *Matricaria recutita* L. (*Chamomilla recutita* (L.) (Rauschert), flos (kwiat rumianku) (1:2); ekstrahent: etanol 70% (V/V).
- Lek nie zawiera substancji pomocniczych.

Lek zawiera 60–68% (V/V) etanolu.