

Baikadent Afto-stop, spray, 30 ml

Cena: 14,24 zł



Opis słownikowy

Postać	Spray
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	"WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE ""HERBAPOL"" S.A."
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Spray na zmiany w jamie ustnej.

Baikadent Afto-stop może być stosowany wspomagająco podczas łagodzenia dolegliwości bólowych wywołanych przez niewielkie zmiany w jamie ustnej takie jak:

- aftowe zapalenia jamy ustnej,
- owrzodzenia aftowe,
- zmiany wywołane noszeniem aparatu ortodontycznego,
- zmiany wywołane przez niewłaściwie dopasowane protezy.

Preparat Baikadent Afto-stop dostępny jest w postaci sprayu (płynu zawierającego aplikator) umieszczonego w butelce o pojemności 30 ml (300 dawek).

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy energicznie wstrząsnąć butelką, następnie kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem. Należy skierować aplikator na zmianę w jamie ustnej i naciskając rozpylić 3 razy lub tyle, ile jest potrzebne aby pokryć zmianę. Zaleca się stosować 3 do 4 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby. Dla lepszego rezultatu nie należy jeść i pić przez godzinę po zastosowaniu.

Skład

woda demineralizowana, glicerol, nanosrebro, nanomiedź, nanozłoto, olejek z mięty pieprzowej, polisorbata 20, olej z pestek winogron,

benzoesan sodu, sorbinian potasu.

Przeznaczenie

Może być stosowany wspomagająco podczas łagodzenia dolegliwości bólowych wywołanych przez niewielkie zmiany w jamie ustnej takie jak:

- aftowe zapalenia jamy ustnej,
- owrzodzenia aftowe,
- zmiany wywołane noszeniem aparatu ortodontycznego,
- niewłaściwie dopasowane protezy.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne. W przypadku ciąży lub karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy poradzić się lekarza.

Środki ostrożności:

Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Nie należy używać po upływie terminu ważności.

Działania niepożądane:

Nie występują w przypadku postępowania zgodnie ze sposobem użycia.