

Bliznasil Żel na blizny Forte, 15 g (tub.)

Cena: 29,21 zł



Opis słownikowy

Postać	Żel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	RADA SP. Z O.O. SP.J.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Powstawanie blizny to naturalne następstwo gojenia się rany - stanowi ostatni etap tego procesu. Jeśli osiągają duże rozmiary, na przykład na skutek rozległych urazów czy oparzeń, mogą stać się przyczyną przykurczy i utrudniać prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto, niepoprawnie wykształcone blizny przerostowe i bliznowce, a czasem również blizny prawidłowe, stanowią urodowy mankament, przyczyniający się do złego samopoczucia właściciela.

Żel forte Bliznasil wspiera regenerację włókien kolagenowych skóry właściwej oraz prawidłową przebudowę i dojrzewanie blizny. W efekcie:

- zmniejsza jej rozmiary i widoczność oraz wyrównuje koloryt;
- uelastycznia tworzącą ją tkankę;
- odtwarza naturalną barierę ochronną skóry;
- redukuje uczucie napięcia i świądu;
- ogranicza ryzyko powstania bliznowców i blizn przerostowych (dzięki obecności ekstraktu w wąkrotki azjatyckiej).

Żel forte Bliznasil wykazuje skuteczność zarówno wobec blizn nowych, jak i starych, będących pozostałością ran pooperacyjnych, pourazowych i poparzeniowych, a także potłuczkowych. Dzięki zawartości filtra UV SPF 15, polecany jest przede wszystkim na zmiany umiejscowione na odsłoniętych fragmentach ciała, wystawionych na wpływ promieni słonecznych.

Preparat ma postać przezroczystego, bezzapachowego i szybko wysychającego żelu silikonowego. Jest łagodny i bezpieczny, toteż może być stosowany u dorosłych i dzieci.

Wskazania do stosowania:

- Blizny:
 - nieprawidłowe: bliznowce (keloidy), blizny przerostowe;
 - pooperacyjne;
 - pourazowe;

- pooparzeniowe;
- potrądzikowe;
- po cesarskim cięciu;
- po terapiach laserowych.
- Rozstępy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

Niewielka ilość żelu 2 razy dziennie.

Sposób użycia

Preparat do stosowania miejscowego.

Leczoną bliznę umyć i dokładnie osuszyć. Wmasować żel i pozostawić do wyschnięcia.

W przypadku nowych blizn (do 6 miesięcy), efekty mogą wystąpić już w przeciągu 1-2 miesięcy, natomiast u dojrzałych (nawet do 10 lat) kuracja może zająć 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Na prawidłowo nałożony i wyschnięty żel można stosować preparaty kosmetyczne.

Podczas używania produktu należy unikać niekorzystnych czynników zewnętrznych, tj. niska i wysoka temperatura, urazy i otarcia w okolicy blizny, ekspozycja na promieniowanie UV.