

Carbo medicinalis VP 300 mg, tabletki, 20 tabl. (2 blist. po 10 tabl.)

Cena: 14,20 zł



Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

CARBO MEDICINALIS VP to produkt leczniczy w postaci tabletki zawierający węgiel aktywowany stosowany w leczeniu:

- biegunek
- niestrawności
- wzdęć
- zatruc niektórymi lekami i innymi związkami chemicznymi.

Węgiel aktywny jest najskuteczniejszym lekiem adsorbującym. Ma dobry profil bezpieczeństwa i w leczeniu zatruc, pod kontrolą lekarza, może być stosowany nawet u dzieci < 1. roku życia.

Skład:

1 tabletkę zawiera 150 mg węgla leczniczego

Dawkowanie:

Tabletki należy przed połyknięciem pogryźć lub rozkruszyć. Lek może być podawany w postaci wodnej zawiesiny. Przeciętnie stosuje się 3-4 tabletek kilka razy na dobę. Przeciwbiegunkowo-10-20 tabletek dziennie.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku u osób uczulonych na węgiel leczniczy lub którykolwiek z pozostałych składników. Nie podawać nieprzytomnym pacjentom z niezabezpieczonymi drogami oddechowymi.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana: wymioty, zwłaszcza u dzieci, zaparcia, aspiracja do płuc zwłaszcza podczas wymiotów po podaniu węgla. Węgiel barwi stolec na czarno.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia węglem aktywnym, ponieważ ciężka i długotrwała biegunka może prowadzić do zaburzeń wodno-elektrolitowych.

Carbo medicinalis VP zawiera sacharozę (253,5 mg w 1 tabletkce), więc należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą, jak również w przypadku osób z nietolerancją niektórych cukrów, którzy powinni skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Nie należy przyjmować jednocześnie z innymi lekami, gdyż może osłabić ich działanie.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Carbo Medicinalis VP po podaniu doustnym neutralizuje działanie innych podanych jednocześnie tą drogą substancji (w tym leków). Z tego powodu jeśli konieczne jest przyjęcie innych leków to należy podać je 2 godziny przed lub po przyjęciu węgla aktywnego.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Producent:

PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA
Jankovcova 1569/2c
Praga, Republika Czeska