

Cetraxal 2 mg/ml, krople do uszu, 15 amp. po 0,25 ml

Cena: 40,28 zł

Opis słownikowy

Postać	Ampułki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Lek na receptę

Opis produktu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Nazwa produktu leczniczego: Cetraxal (Ciprofloxacinum) 2 mg/ml, krople do uszu, roztwór.

Skład: 1 ml roztworu zawiera 2 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodoru.

Opakowanie: 15 ampułek w postaci monodawki (0,25 ml).

Wskazania do stosowania: ostre zapalenia ucha zewnętrznego o podłożu bakteryjnym, w sytuacji, gdy błona bębenkowa nie została uszkodzona.

Dawkowanie: dorośli i dzieci w wieku od 1. roku życia oraz starsze, zakraplać zawartość pojedynczej ampułki do chorego ucha dwa razy dziennie przez siedem dni.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną cyprofloksacynę lub inną substancję z grupy chinolonów lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Specjalne ostrzeżenia: Cetraxal przeznaczony jest do podawania do ucha, nie należy podawać go do oka, inhalacji czy wstrzykiwania. U pacjentów poniżej 1. roku życia, oraz u pacjentów z perforacją błony bębenkowej, bezpieczeństwo stosowania nie zostało ustalone. Interakcje z innymi produktami leczniczymi: nie przeprowadzono konkretnych badań w zakresie interakcji produktu Cetraxal z innymi produktami leczniczymi. Ze względu na przewidywany bardzo niski poziom produktu w osoczu krwi po podaniu do ucha mało prawdopodobne jest, aby cyprofloksacyna powodowała ogólnoustrojowe interakcje. Nie zaleca się stosowania innych produktów do ucha równocześnie z Cetraxalem.

Wpływ na ciążę i laktację: Cetraxal może być stosowany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn: brak wpływu.

Działania niepożądane: najczęściej zgłaszane obejmują: swędzenie ucha (0,9% pacjentów), bóle głowy i ból w miejscu zastosowania produktu (0,6% pacjentów). Wszystkie działania niepożądane związane z leczeniem występują niezbyt często ($\geq 1/1000$ do $< 1/100$): swędzenie ucha, brzęczenie w uszach, zawroty głowy, ból głowy, zapalenie skóry, ból w miejscu stosowania produktu. Przy miejscowym zastosowaniu fluorochinolonów, bardzo rzadko występują: wysypka ogólna, toksyczne martwicze oddzielenie się naskórka, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa – Johnsona, a także pokrzywka.

Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice.

Nr pozwolenia Prezesa URPLW MiPB: 20161.

Produkt wydawany z przepisu lekarza: Rp.