

Chlorivag Kadefarm, globulki dopochwowe, 10 glob. po 2 g

Cena: 29,30 zł



Opis słownikowy

Postać	Globulki dopochwowe
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	KADEFARM SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis

Wyrób medyczny Chlorivag® wykazuje działanie zapobiegawcze i wspomagające w infekcjach pochwy o charakterze zapalnym, zakaźnym lub dystroficznym. Z uwagi na swój skład rekomendowany jest w przypadku zaczerwienienia, świądu i pieczenia z oznakami mikozy i waginozy. Obecny w składzie kwas hialuronowy o właściwościach mukoadhezyjnych wykazuje działanie nawilżające i ochronne na śluzówkę pochwy.

Wskazania

- terapia wspomagająca przed- i pooperacyjna w chirurgii ginekologicznej,
- profilaktyka w nawrotach infekcji śluzówki pochwy o charakterze zapalnym, dystroficznym lub zakaźnym,
- terapia wspomagająca w odbudowie prawidłowego nawilżenia śluzówki pochwy,
- pomocniczo w przypadku świądu, zaczerwienień i podrażnień spowodowanych przez różnego rodzaju infekcje.

Skład

1 globulka 2 g zawiera: sól sodową kwasu hialuronowego, witaminę E, bromelainę, dichlorowodorek chlorheksydyny, mieszanekę trójglicerydów.

Stosowanie

Pacjentki po leczeniu przeciwzapalnym: 2 razy dziennie 1 globulka, przez dwa dni; następnie 1 globulka co drugi dzień, przez około dwa tygodnie.

Pacjentki ze skłonnością do częstych infekcji, w okresie menopauzy, stosujące antykoncepcję hormonalną: dwa razy w tygodniu 1 globulka. W terapii przewlekłej, powyżej 1,5 miesiąca, utrzymywać dawkowanie dwa lub trzy razy w tygodniu 1 globulkę.