

Cholesol, płyn doustny, 100 g



Cena: 15,50 zł

Opis słownikowy

| | |
|--|---|
| Producent / Podmiot Odpowiedzialny | WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A. |
| Przechowywanie | Temperatura pokojowa |
| Rejestracja | OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty |

Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cholesol®

płyn doustny, lek bez recepty

Płyn doustny **Cholesol®** stosuje się w leczeniu objawów niestrawności jako środek żółciopędny.

Lek Cholesol jest to tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Jak stosować lek Cholesol

Stosować doustnie.

Dorośli: do 3 razy dziennie po 1 łyżeczce (5 ml) leku w ½ szklanki wody.

Młodzież od 14 do 18 lat: do 3 razy dziennie po ½ łyżeczki leku w ½ szklanki wody.

Dzieciom do lat 14 ze względu na obecność etanolu nie podawać.

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana

Objawy przedawkowania Cholesolu mogą wynikać z przedawkowania etanolu zawartego w produkcie.

Pominięcie zastosowania leku Cholesol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cholesol

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zanim zastosuje się Cholesol

Kiedy nie stosować leku Cholesol

Leku Cholesol nie należy stosować jeśli pacjent ma stwierdzoną:

- nadwrażliwość na substancje czynne leku w tym na kwiaty rumianku oraz rośliny z rodziny astrowatych *Asteraceae* (dawniej: *Złożonych / Compositae*),
- niedrożność dróg żółciowych.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cholesol

U osób ze zdiagnozowaną kamicą żółciową preparat może być stosowany wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.

Cholesol zawiera 54-62 % (v/v) etanolu. 1 łyżeczka leku (5 ml) zawiera ok. 2,5 g etanolu, co jest równoważne 63 ml piwa i 26 ml wina.

Szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych klinicznych oraz zawartość w produkcie etanolu nie należy podawać leku Cholesol dzieciom i młodzieży do lat 14.

Lek Cholesol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji Cholesolu z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na niewystarczające dane o bezpieczeństwie i duże stężenie etanolu, leku Cholesol nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ leku na płodność nie jest znany. Jeśli pacjentka może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Łyżeczka leku (5 ml) zawiera ok. 2,5 g etanolu. Stosowanie leku osłabia w niewielkim lub umiarkowanym stopniu zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwanie maszyn, a także ogólną sprawność psychoruchową. Alkohol zawarty w produkcie może zostać wykryty przez urządzenie

analizujące wydmuchiwane powietrze (tester trzeźwości – alkomat).

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Cholesol może powodować objawy niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Dotychczas nie raportowano działań niepożądanych podczas stosowania produktu leczniczego Cholesol.

Przechowywanie leku Cholesol

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować po upływie terminu ważności.

Skład

100 g produktu leczniczego:

- **89 g** wyciągu złożonego (1:2) z:
 - kwiatu kocanek (*Helichrysi flore*),
 - kwiatu rumianku (*Matricariae flore*),
 - owocu kolendry (*Coriandri fructu*),
 - owocu bzu czarnego (*Sambuci fructu*),[ekstrahent: etanol 60% v/v] (24 :15,5 : 7,5 : 3)
- Inkrakt z mniszka lekarskiego (*Taraxaci intractum*), [ekstrahent: etanol 96% v/v, 1:1] – **11 g**

Cholesol zawiera średnio 58% (v/v) etanolu tzn. ok. 2,5 g w 1 łyżeczce (5 ml).

Opakowanie: 100 g płynu