

# Czopki glicerynowe, MILAX-M dla dorosłych 2500mg, 10sztuk

Cena: 5,17 zł



## Opis słownikowy

Postać	Czopki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	New.Fa.Dem. S.r
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Czopki glicerynowe, MILAX-M dla dorosłych 2500mg, 10sztuk

Wyrób medyczny

Wskazaniem do stosowania tego wyrobu medycznego są zaparcia. Te mogą pojawiać się różnych przyczyn, a ich skutkiem jest utrudnione wypróżnianie. Czopki Milax-M dla dorosłych działają przeczyszczająco

### Skład

Glicerol, stearynian sodu, wodorowęglan sodu.

### Działanie

Działanie wyrobu opiera się na właściwościach glicerolu, który oddziałując miejscowo drażniąco pobudza perystaltykę jelit, rozluźnia stolec i zwiększa jego poślizg.

### Wskazania

stosowany jest w zaparciach jako środek ułatwiający wypróżnienie.

### Sposób użycia:

- Wyjąć czopek z aluminiowego blistra.
- Wprowadzić czopek głęboko, zaokrąglonym końcem do odbytnicy.
- Po aplikacji należy umyć dłonie.
- Stosować doraźnie 1 czopek, 1 lub 2 razy dziennie.

### **Przeciwwskazania i środki ostrożności**

W przypadku uporczywych zaparć konieczna jest konsultacja z lekarzem, aby wykluczyć inne patologie.

### **Uwagi i środki ostrożności**

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia wyrobu.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem. W przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu lub wcześniejszego zapalenia błony śluzowej, może wystąpić podrażnienie błony śluzowej odbytu.
- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 4° do 30°C, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Środki przeczyszczające należy stosować tak rzadko, jak to możliwe i nie dłużej niż 7 dni. Stosowanie przez dłuższy czas wymaga konsultacji z lekarzem. W epizodach zaparć wskazane jest najpierw skorygowanie nawyków żywieniowych poprzez uzupełnienie codziennej diety o odpowiednią podaż błonnika i wody. W okresie ciąży i laktacji należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem produktu.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Z uwagi na brak dostępnych badań dotyczących stosowania produktu w okresie ciąży i laktacji, przed zastosowaniem wyrobu należy skonsultować się z lekarzem.