

## Debutir, kapsułki, 60 kaps.



Cena: 38,26 zł

### Opis słownikowy

Postać	Kapsułki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

### Opis produktu

## DEBUTIR KAPSUŁKI

### OPIS I PRZEZNACZENIE

**DEBUTIR** to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kapsułek, zawierających maślan sodu w mieszaninie acylogliceroli (mono-, di- i triacyloglicerole), powlekanych membraną alginianu sodu. Dzięki innowacyjnej formule otoczki, maślan sodu dociera do jelita grubego (okrężnicy).

### SKŁADNIKI

maślan sodu, całkowicie uwodorniony olej palmowy, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancja zagęszczająca: alginian sodu, środek zmętniający kapsułkę (barwnik węglan wapnia; tlenek cynku, skrobia, maltodekstryna, stabilizator guma arabska), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancje żelujące: karagen, chlorek potasu.

### Informacja o wartości odżywczej i skład produktu:

Wartość odżywcza	w 100 g produktu	w 1 kapsułce	w 2 kapsułkach
Wartość energetyczna	2017kJ/491 kcal	7,87 kJ/1,91 kcal	15,74 kJ/3,82 kcal
Tłuszcz	43,35 g	0,17 g	0,34 g

w tym kwasy t?uszczowe	43,06 g	0,17 g	0,34 g
nasycone			
W?glowodany	6,67 g	0,03 g	0,6 g
w tym cukry	0 g	0 g	0 g
Bia?ko	0 g	0 g	0 g
Sól	22,17g	0,10g	0,20 g
z czego sól	8,90 g	0,04 g	0,08 g

#### Sk?adniki charakteryzuj?ce produkt

Ma?lan sodu	37,970 g	150 mg	300 mg
w tym kwas mas?owy	30,380 g	120 mg	240 mg

#### SPOSÓB UŻYCIA

- **Dorośli:** doustnie 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 3 miesięcy.
- **Dzieci powyżej 7. roku życia:** doustnie 1 kapsułka dziennie, najlepiej wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 6 tygodni.

#### WAŻNE INFORMACJE

Kapsułkę należy połknąć w całości (bez rozgryzania i wysypywania zawartości), popijając letnią lub chłodną wodą. Najlepiej przyjmować w trakcie posiłku.  
W zależności od indywidualnego zapotrzebowania, lekarz może zalecić inne porcje do spożycia preparatu.

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I PRZECIWWSKAZANIA

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Nie stosować u dzieci z zaburzeniami połykania lub w przypadkach, gdy połykanie kapsułek sprawia trudność. Przy uczuleniu (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik produktu Debutir należy zaprzestać jego stosowania.

#### WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 , w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

#### PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA  
ul. Pelplińska 19  
83-200 Starogard Gdański