


Delicol na kolkę niemowlęcą, krople doustne, 15 ml



Cena: 32,36 zł

Opis słownikowy

Postać	Krople
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Opis produktu

Opis:

Właściwości i zastosowanie:

Delicol może być używany zarówno podczas karmienia piersią, jak również podczas karmienia mlekiem modyfikowanym.

Produkt Delicol przeznaczony dla niemowląt od urodzenia do 3-4 miesiąca życia.

Delicol stanowi żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kropli i jest przeznaczony do postępowania dietetycznego w stanach przejściowych dolegliwości trawiennych spowodowanych nietolerancją laktozy w żywieniu u niemowląt.

Niedobór laktazy może skutkować przejściowymi dolegliwościami trawiennymi spowodowanymi nietolerancją laktozy w żywieniu.

Może to być istotny czynnik u dzieci z kolką.

Delicol rozkłada laktozę zawartą w mleku i sprawia, że staje się ono lepiej przyswajalne. Dzięki temu eliminuje dolegliwości kolkowe.

Składniki:

maltoza

woda

sacharoza

maltodekstryna

laktaza

chlorek sodu

Enzym laktaza naturalnego pochodzenia, z wyciągu grzyba *Aspergillus oryzae*

Wartości odżywcze - 100 ml

Wartość energetyczna 1344,7 kJ (320,7 kcal)

tłuszcz <0,1 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,1 g

węglowodany 78,3 g
w tym cukry 55,1 g
białko 1,97 g
sól 0,07 g
laktaza 1,57 g

Dawkowanie

Doustnie. Karmienie piersią. Dzieci 0-2 tyg.: 7-8 kropli na posiłek, dzieci 3-4 tyg.: 8-9 kropli na posiłek, dzieci 1-2 mies.: 9-11 kropli na posiłek, dzieci 2-3 mies.: 11-14 kropli na posiłek, dzieci 3-4 mies.: 12-15 kropli na posiłek, dzieci >4 mies. 14-17 kropli na posiłek. Sposób podania: odmierzyć na łyżeczkę odpowiednią ilość kropli i podać do bezpośredniego spożycia. Kontynuować karmienie piersią. Mleko modyfikowane. Mleko należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta, a następnie dodać do niego krople. 60 ml mleka: 6-7 kropli, 90 ml mleka: 6-10 kropli, 120 ml mleka: 7-14 ml, 150 ml mleka: 10-17 kropli, 180 ml mleka: 11-20 kropli, >180 ml mleka: 15-25 kropli. Nie przechowywać niespożytego mleka. Preparat powinien być podawany w okresie pierwszych 3-4 mż., następnie powinien być stopniowo odstawiany. Ilość kropli dodawana do posiłku powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb organizmu. Z tego względu zaleca się, aby początkowo stosować minimalną ilość kropli, a w przypadku braku skuteczności stopniowo zwiększać porcję maksymalnie do górnej wartości z podanych przedziałów.

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: na ulotce wewnątrz opakowania. Wstrząsnąć przed użyciem. Stosować pod nadzorem lekarza.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie narażać na działanie promieni słonecznych i ciepła.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Producent

Afłofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.,
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice