

Depulol (50mg + 50mg + 60mg)/g, żel, 20 g



Cena: 13,86 zł

Opis słownikowy

Postać	Żel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

DEPULOL

(Rosmarini aetheroleum + Eucalypti aetheroleum + Balsamum peruvianum)

(5% + 5% + 6%), żel

Skład

100 g żelu zawiera:

Substancje czynne:

Olejek eukaliptusowy 5,0 g

Olejek rozmarynowy 5,0 g

Balsam peruwiański 6,0 g

i substancje pomocnicze: Karbomer 934 P, sodu wodorotlenek 30%, Polisorbat 20, emulgator

Pionier 5300, woda oczyszczona.

Opakowanie leku Depulol zawiera 20 g żelu.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Depulol i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Depulol

3. Jak stosować lek Depulol
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Depulol
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Depulol i w jakim celu się go stosuje

Depulol, żel jest lekiem stosowanym tradycyjnie i jego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Depulol, żel zalecany jest pomocniczo w chorobach z przeziębienia, z towarzyszącymi im utrudnieniem odkrztuszania i kaszlem.

2. Zanim zastosuje się lek Depulol

Nie należy stosować leku Depulol, jeśli występuje uczulenie na balsam peruwiański lub propolis bądź nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu, jak również u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować żel DEPULOL, ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Zachować szczególną ostrożność stosując Depulol

Należy zachować szczególną ostrożność u osób ze skłonnością do astmy. Nie należy stosować w obrębie twarzy, zwłaszcza nosa, ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli.

Nie należy stosować na dużą powierzchnię ciała. Nie należy stosować na uszkodzoną powierzchnię skóry (otwarte rany), oparzenia, błony śluzowe.

Leku nie powinny stosować osoby ze skłonnością do alergii, w szczególności osoby, u których wystąpiła nadwrażliwość na kwasy aromatyczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy) lub produkty zawierające tego rodzaju związki (np. propolis).

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Depulol u dzieci

Lek może być stosowany u dzieci od 6. miesiąca życia.

Ciąża

Brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży, dlatego nie zaleca się stosowania.

Karmienie piersią

Brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie karmienia piersią, dlatego nie zaleca się stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Depulol

Lek stosuje się na skórę, dwa razy na dobę (rano i wieczorem) przez okres występowania dolegliwości, nacierając niewielką ilością żelu górne partie pleców i klatki piersiowej.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Depulol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Depulol niż zalecana

W razie zastosowania na skórę zbyt dużej ilości leku i wystąpienia niepokojących objawów, np. podrażnienia skóry lub duszności, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Depulol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Depulol może powodować działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry (rumień), objawów uczulenia np. wysypki, zwłaszcza u dzieci, należy przerwać stosowanie leku. Jeśli objawy nie ustąpią, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Depulol mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Depulol

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Depulol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego:

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. (071) 352 95 22

Dział Informacji o Leku

tel. (022) 742 00 22