

Dermovit F 25 mg/g, maść, 30 g (poj.)

Cena: 12,49 zł



Opis słownikowy

Postać	Maść
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne COEL S.J. E.Z.M. Konstany
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Retinoli palmitas
Maść, 500 j.m./g

Skład:

1 g maści zawiera:

Substancje czynne:

– 500 j.m. palmitynianu retynolu,

Substancje pomocnicze:

– lanolina bezwodna,

– wazelina biała,

– olejek lawendowy,

– woda oczyszczona.

Lek do stosowania miejscowego na skórę.

Wskazania do stosowania:

Lek do stosowania miejscowego na skórę, wskazany w celu ochrony skóry przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (zimnem, wiatrem), po przebytych niewielkich odmrożeniach, oparzeniach, w nadmiernej suchości skóry i nadmiernym rogowaceniu naskórka.

Dawkowanie i sposób stosowania:

Na chorobowo zmienione, uprzednio oczyszczone miejsca na skórze wcierać cienką warstwą maści raz do dwóch razy na dobę – w razie konieczności stosować kilka razy na dobę.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku w nadwrażliwości na retynolu palmitynian (witaminę A) i lanolinę lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych leku.

Środki ostrożności:

Nie należy stosować leku na rany oraz błony śluzowe. Chronić oczy przed kontaktem z lekiem. Ze względu na zawartość lanoliny lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Stosowanie z innymi lekami:

Podczas leczenia nie stosować maści lub kosmetyków o działaniu wysuszającym i ściągającym.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych na temat stosowania leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Witamina A w dużych dawkach może uszkadzać płód.

Działania niepożądane:

Mogą wystąpić odczyny uczuleniowe.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, również nie wymienionych powyżej, należy poinformować o nich lekarza

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Pozwolenie R/2605.