

Dernilan, krem, 35 g



Cena: 14,70 zł

Opis słownikowy

Postać	Krem
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	"Wrocławskie Zakłady Zielarskie ""Herbapol"" S.A."
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Lek Dernilan® krem dzięki skojarzonemu działaniu składników: alantoiny, nikotynamidu, kwasu salicylowego i kamfory działa przeciwzapalnie i gojąco, ułatwia usuwanie zgrubiałego, zrogowaciałego naskórka ze stóp i rąk.

Preparat stosuje się w przypadkach bolesnych i głębokich pęknięć zgrubiałego i zrogowaciałego naskórka, w pielęgnacji skóry stóp i rąk.

Jak stosować lek Dernilan krem

Skórę stóp i rąk smarować kremem od 3 do 4 razy na dobę.

Krem lekko wmasować, co kilka dni stopy lub ręce wymoczyć i usunąć zrogowaciały naskórek. Po wygojeniu zmian, krem stosować 1 do 2 razy na dobę po umyciu stóp i rąk.

Zanim zastosuje się lek Dernilan krem

Nie należy stosować leku Dernilan krem

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (kamforę racemiczną, alantoinę, nikotynamid lub kwas salicylowy) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- Na rozległe obszary uszkodzonej skóry oraz na błony śluzowe.

Stosowanie leku Dernilan krem u dzieci:

Nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz wpływu na płodność.

Nie należy stosować leku Dernilan krem w okresie ciąży lub karmienia piersią, jeśli nie zdecyduje o tym lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek Dernilan krem nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dernilan krem:

Zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Zawiera alkohol stearylowy. Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Stosowanie innych leków:

Brak danych na temat możliwych interakcji alantoiny, amidu kwasu nikotynowego i kamfory stosowanych miejscowo na skórę.

Kwas salicylowy występujący w kremie może nasilać działanie terapeutyczne innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, krem Dernilan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne i miejscowe podrażnienia (nieznana częstość występowania – nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Przechowywanie leku Dernilan krem

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności.

Skład

Substancje czynne zawarte w 100 g kremu:

kamfora racemiczna (Camphora racemica) 1 g

alantoina (Allantoinum) 300 mg

nikotynamid (Nicotinamidum) 250 mg

kwas salicylowy (Acidum salicylicum) 100 mg

Opakowanie: tuba 35 g