

Dicopeg Si, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 10 sasz. po 15 g



Cena: 35,89 zł

Opis słownikowy

Postać	Saszetki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	VITIS PHARMA
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdy ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

DICOPEG Si 15g * 10 sasz.

Skład

Makrogl, dwutlenek krzemu, symetykon, sukraloza. Nie zawiera glutenu.

Wskazania i działanie

Dicopeg Si jest wyrobem medycznym przeznaczonym do objawowego leczenia zaparcia. Wspomaga perystaltykę, ułatwia odpowiednie opróżnianie jelit, przeciwdziałając w ten sposób zaparciom i zapobiegając tworzeniu się zbitych mas kałowych. Ułatwia również eliminację gazów jelitowych, zmniejszając uczucie wzdęcia i rozdęcia jamy brzusznej.

Dicopeg Si ma postać proszku do sporządzenia roztworu doustnego.

Makrogl jest rozpuszczalnym w wodzie, obojętnym polimerem o wysokiej masie cząsteczkowej, który ma zdolność wiązania wody spożywanej wraz z preparatem, zatrzymując ją w stolcu. Nawadnia i zmiękcza masę kałową i ułatwia jej wydalanie. Przyspiesza pasaż jelitowy poprzez pobudzenie perystaltyki. Nie jest wchłaniany ani metabolizowany w przewodzie pokarmowym i przyjmowany wraz z płynem we wskazanych dawkach nie prowadzi do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej.

Symetykon jest substancją, która ma zdolność zmniejszania napięcia powierzchniowego pęcherzyków gazu w przewodzie pokarmowym, ułatwiając ich wydalanie.

Przeciwwskazania

Nie należy przyjmować Dicopeg si w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na makrogl lub inny składnik produktu, perforacji, niedrożności lub zwężenia jelit, porażennej niedrożności jelit, poważnych chorób zapalnych jelit takich, jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostre rozdęcie okrężnicy. Stosowanie środków przeczyszczających jest przeciwwskazane w przypadku ostrego bólu w jamie brzusznej lub nieznanego pochodzenia, nudności i wymiotów, krwawienia z odbytnicy nieznanego pochodzenia oraz w przypadku ciężkiego odwodnienia.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat (>43 kg)

1 do 3 saszetek dziennie

Dawkę należy zwiększać lub zmniejszać, w zależności od indywidualnej reakcji na leczenie, aby umożliwić regularne wypróżnianie miękkich stolców. Maksymalna potrzebna dawka nie przekracza zazwyczaj 3 saszetek na dobę.

Proszek rozpuścić w wodzie lub innym płynie (180 ml na saszetkę) i natychmiast zażyć. W przypadku przyjmowania minimalnej dawki (1 saszetka dziennie) zaleca się przyjmowanie produktu rano. W przypadku większych dawek, należy je podzielić na porcje przyjmowane rano i wieczorem.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (ból w jamie brzusznej, wzdęcia, uczucie pełności w jamie brzusznej, nudności, nietrzymanie stolca). Biegunka jest wtórnym efektem przyjmowania zbyt wysokich dawek Dicopeg si i można jej uniknąć zmniejszając dawkę. Rzadko zgłaszano przypadki nadwrażliwości (wysypka skórna) po zastosowaniu produktów zawierających makrogol. W razie potrzeby należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Sposób użycia

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat (>43 kg)

– 1 do 3 saszetek dziennie

Dawkę należy zwiększać lub zmniejszać, w zależności od indywidualnej reakcji na leczenie, aby umożliwić regularne wypróżnianie miękkich stolców. Maksymalna potrzebna dawka nie przekracza zazwyczaj 3 saszetek na dobę.

Proszek rozpuścić w wodzie lub innym płynie (180 ml na saszetkę) i natychmiast zażyć. W przypadku przyjmowania minimalnej dawki (1 saszetka dziennie) zaleca się przyjmowanie produktu rano. W przypadku większych dawek, należy je podzielić na porcje przyjmowane rano i wieczorem.

Ostrzeżenia

Podawanie dzieciom powinno odbywać się przy bezpośrednim nadzorze osoby dorosłej. Jako środek ostrożności, przed stosowaniem w czasie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować po upływie terminu ważności wskazanym na opakowaniu i saszetce. Nie stosować, jeżeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej.

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Temperatura przechowywania 15-25st.C

Producent

VITIS PHARMA

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.