

Dicostop, płyn, 10 sasz.



Cena: 16,82 zł

Opis słownikowy

Postać	Saszetki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	VITIS PHARMA
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Płynny wyrób medyczny w saszetce, do jednorazowego użytku, wskazany w doustnym leczeniu ostrych i przewlekłych biegunek i dolegliwości bólowych związanych z zaburzeniami czynności przewodu pokarmowego.

Diosmektyt zawarty w preparacie DICOSTOP łączy się z glikoproteinami warstwy śluzowej pokrywającej ścianę przewodu pokarmowego, zmieniając ich charakterystykę fizyczną, tworząc chłonny żel, który chroni przed nadmiernym wydzielaniem kwasu i substancjami drażniącymi żołądek, a także stanowi barierę przeciw mechanizmom zapalnym.

Sposób użycia

Dorośli: 1 saszetka 3 razy dziennie.

Dzieci w wieku 6-12 lat: 1 saszetka 2-3 razy dziennie.

Dzieci w wieku 2-6 lat: 1 saszetka 1-2 razy dziennie.

Każda saszetka może być użyta tylko raz po jej otwarciu. Energicznie ugnieść zawartość saszetki przed jej otwarciem. Produkt może być przyjmowany bezpośrednio lub rozpuszczony w szklance wody lub w innych napojach (sok, jogurt). Po otwarciu, zawartość saszetki powinna być przyjęta w całości, produkt jest jednorazowego użycia. Wszelkie pozostałości roztworu nie mogą być przyjęte później w ciągu dnia. W przypadku małych dzieci, zawartość saszetki można podać w butelce do karmienia, po zmieszaniu z 50 ml wody lub innego napoju, podzieloną na 2-3 dawki w ciągu dnia. Możliwe jest także dodanie preparatu DICOSTOP do pokarmów półpłynnych. Doradza się przyjmowanie preparatu DICOSTOP pomiędzy posiłkami.

W leczeniu ostrej biegunki należy stosować doustny płyn nawadniający (DPN) w celu uniknięcia odwodnienia.

Ważne informacje

Ostrzeżenia:

- Wyrób przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Energicznie ugnieść saszetkę przed użyciem.
- Nie stosować dłużej niż 10 kolejnych dni. Jeżeli objawy się utrzymują, należy skonsultować się z lekarzem.

- Jeżeli u dzieci biegunka utrzymuje się przez dłużej niż 3 dni, należy zwrócić się po poradę medyczną.
- Nie przyjmować wyrobu w pozycji leżącej.
- Nie stosować wyrobu po dacie ważności podanej na pudełku i saszetce.
- Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
- Każda saszetka jest jednorazowego użytku i powinna być otwarta wyłącznie tuż przed jej zastosowaniem; nie należy ponownie używać saszetek częściowo zużytych, ponieważ może się to wiązać z ryzykiem nieskuteczności roztworu lub skażenia preparatu DICOSTOP.
- Nie przekraczać zalecanej dawki, w przypadku działań niepożądanych (zaparcie, bóle jelit, wzdęcia) przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku nieoczekiwanych działań niepożądanych, innych niż te wymienione powyżej, należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku uszkodzeń żołądka lub jelit lub w przewlekłym zaparciu lub podrażnieniu i niedrożności jelit.
- Wyrób medyczny zawiera aluminium pochodzące z diosmektytu; jeżeli stosowane są inne produkty lub leki zawierające diosmektyt, glinkę lub związek aluminium, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem preparatu DICOSTOP.
- Nie stosować tego wyrobu medycznego podczas używania innych wyrobów lub leków doustnych: zdolność chłonna diosmektytu może niekorzystnie wpływać na ich skuteczność. W przypadku stosowania równoczesnych terapii lekowych, przed przyjęciem preparatu DICOSTOP należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania i ograniczenia stosowania:

Nie stosować wyrobu medycznego u dzieci przed ukończeniem drugiego roku życia. Nie stosować wyrobu w przypadku znanej nadwrażliwości na składniki tego wyrobu medycznego. Nie stosować wyrobu medycznego u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

Przechowywanie

DICOSTOP nie powinien być stosowany po dacie ważności podanej na opakowaniu. DICOSTOP należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C); unikać ekspozycji na bezpośrednie źródła światła, ciepło i nadmierną wilgotność.

Składniki

Jedna saszetka DICOSTOP zawiera:

Składnik aktywny: diosmektyt (1,5 g).

Substancje pomocnicze: woda oczyszczona, EDTA, guma karaya, metyloparaben sodowy, estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, aromaty, kwas cytrynowy, benzoesan sodowy, sukraloza.