

# EnterosGel, żel, 225 g



Cena: 82,55 zł

## Opis słownikowy

Postać	Zawiesina
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	IN NOVATION SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

#### **ZALECANE ZASTOSOWANIE**

ENTEROSGEL® to zawiesina doustna przeznaczona do leczenia objawowego ostrej biegunki i chronicznej biegunki w zespole drażliwego jelita (IBS).

#### **CO TO JEST ENTEROSGEL® I JAKIE JEST JEGO PRZEZNACZENIE?**

ENTEROSGEL® to doustny jelitowy adsorbent (enterosorbent). Działa na bazie minerału organicznego ze zdolnością adsorpcyjną w odniesieniu do niektórych toksycznych i szkodliwych substancji w jelicie (takich jak endotoksyny, enterotoksyny): wiąże je fizycznie na swojej powierzchni i obniża tym samym częstość oddawania stolca oraz skraca utrzymywanie się biegunki. ENTEROSGEL® jest wydalany z organizmu ze stolcem i w ten sposób usuwa adsorbowane toksyny i substancje szkodliwe, co może przynosić korzystne efekty w leczeniu wskazanych stanów ostrej biegunki i przewlekłej biegunki w zespole drażliwego jelita.

### **Skład:**

Polymethylsiloxane polyhydrate (hydrożel kwasu metylokrzemowego) – 70 %, woda oczyszczona – 30 %. ENTEROSGEL® nie zawiera konserwantów, barwników, glutenu, tłuszczów, cukru, laktozy, aromatów, składników pochodzenia roślinnego ani zwierzęcego.

#### **ZALECANE DAWKOWANIE**

- ENTEROSGEL® należy przyjmować 2 godziny przed lub po zażyciu leków doustnych.
- ENTEROSGEL® należy stosować przez 3 do 5 dni podczas ostrej biegunki i przez okres do 21 dni w razie przewlekłej biegunki.
- Przed podaniem wyrób należy rozprowadzić w wodzie o temperaturze pokojowej.
- Saszetkę zużyć od razu po otwarciu. Zawartość saszetki rozprowadzić w wodzie.
- Wyrób zużyć w ciągu 30 dni po otwarciu tuby

## OKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE

### Dzieci:

Wiek od 1 do 3 roku życia: przed podaniem wyrobu ENTEROSGEL® należy skonsultować się z lekarzem.

1-6 lat: 5 g (ok. 1 łyżeczka od herbaty lub 1/3 saszetki) rozproszyc w 50-100 ml wody, 3x dziennie.

7-14 lat: 10 g (ok. 2 łyżeczki od herbaty lub 2/3 saszetki) rozproszyc w 50-100 ml wody, podawać 3x dziennie.

Dorośli i dzieci powyżej 15 lat: 15 g – 22,5 g (ok. 1 łyżka stołowa lub 1 – 1,5 saszetki) rozproszyc w 200 ml wody, podawać 3x dziennie.

W początkowej fazie leczenia (w pierwszym dniu) można podwoić pierwszą dawkę, a następnie podawać poszczególne dawki po każdym stolcu, 3 do 6 razy dziennie. Nie przekraczać 8 dawek w pierwszym dniu.

- Należy przerwać leczenie z użyciem ENTEROSGELU® jeżeli w ciągu 1-2 dni nie pojawi się stolec i zwiększyć ilość wypijanej wody, a następnie podjąć leczenie po kolejnym stolcu.
- W leczeniu przewlekłej biegunki dawkowanie można dostosować do konsystencji i częstotliwości oddawania stolca. Można podać nawet podwójną dawkę 3x dziennie, jeżeli stolec jest rzadki lub obniżyć dawkę do 1 podania dziennie w przypadku normalnego stolca. Nie należy przekraczać 6 dawek dziennie.

## PRZECIWSKAZANIA

Nie należy stosować wyrobu medycznego ENTEROSGEL®:

- u osób stosujących jednocześnie leki doustne o modyfikowanym (kontrolowanym) uwalnianiu,
- u osób cierpiących na atonię jelit (poważne zaparcia wywołane przez obstrukcję jelit) lub niedrożność jelit,
- u osób z nietolerancją preparatu stosowanego w przeszłości.

## MOŻLIWE SKUTKI NIEPOŻĄDANE

Zaparcia, nudności.

## CIĄŻA I KARMIE NIE PIERSIĄ

ENTEROSGEL® może być podawany w trakcie ciąży i karmienia piersią. Kobiety, które źle się czują w trakcie ciąży lub karmienia piersią, powinny skonsultować się z lekarzem.

## ŚRODKI PROFILAKTYCZNE

ENTEROSGEL® może wpływać na adsorpcję niektórych leków podawanych doustnie – ENTEROSGEL® należy podawać 2 godziny przed lub po podaniu leku doustnego. Osoby przyjmujące inne leki przed rozpoczęciem stosowania wyrobu ENTEROSGEL® powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

- ENTEROSGEL® należy przyjmować doustnie między posiłkami.
- W razie długiego utrzymywania się biegunki przed podaniem ENTEROSGELU® należy skonsultować się z lekarzem w celu zdiagnozowania głównej choroby.
- W leczeniu biegunki u dzieci powinno się jak najwcześniej podać doustny roztwór nawadniający, aby zapobiec odwodnieniu.
- W trakcie leczenia dorosłych z użyciem ENTEROSGELU® zaleca się podawanie doustnego roztworu nawadniającego w celu zapewnienia właściwego nawodnienia organizmu.
- Jeżeli objawy biegunki utrzymują się dłużej niż 2 dni, należy skonsultować się z lekarzem.
- Jeżeli pojawi się gorączka, krew w stolcu, objawy odwodnienia, sześć lub więcej stolców w ciągu ostatnich 24 godzin, lub jeżeli bieguncce towarzyszą wymioty czy silne albo nieustępliwie bóle brzucha, należy niezwłocznie udać się do lekarza, zwłaszcza w przypadku dzieci.
- Brak danych klinicznych dotyczących stosowania wyrobu ENTEROSGEL® w pierwszym trymestrze ciąży. Przed podaniem wyrobu ENTEROSGEL® należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie używać wyrobu po upływie terminu ważności.
- Nie używać wyrobu z uszkodzonym opakowaniem.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie przekraczać zalecanej dawki.
- Nie przekraczać zalecanego okresu leczenia i nie stosować razem z posiłkami, tak aby nie nastąpił ewentualny niedobór witamin lub składników odżywczych.
- Osoby przyjmujące jednocześnie inne adsorbenty jelitowe, np. zawierające aktywny węgiel, glinę lub kaolin, powinny skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zalecić, by nie stosować tych preparatów razem z wyrobem ENTEROSGEL®.
- Nie należy używać wyrobu ENTEROSGEL® w razie ostrego zatrucia chemicznego, zatrucia lekami lub w razie przedawkowania leków.

### Saszetki

- Otwartą saszetkę można użyć tylko raz.
- Saszetki są przeznaczone do jednorazowego użytku, należy je otworzyć bezpośrednio przed użyciem.
- Nie należy stosować ponownie częściowo wykorzystanych saszetek – mogą być zanieczyszczone przez bakterie.

### Tuby

- Tubę należy dobrze wstrząsnąć przed otwarciem i przed każdym użyciem.
- Podczas wyciskania wyrobu ENTEROSGEL z tuby lub saszetki może pojawić się niewielka ilość płynu.
- Po otwarciu i każdym użyciu należy dobrze dokręcić wieczko tuby, aby zapobiec wysychaniu i zanieczyszczeniu przez bakterie.
- Wyrób zużyć w ciągu 30 dni po otwarciu tuby.

Wymiary opakowania – szt.

wysokość 196 mm, szerokość 55 mm, długość 63 mm

### Warunki przechowywania:

- Nie należy używać wyrobu ENTEROSGEL® po upływie daty ważności wskazanej na opakowaniu.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- ENTEROSGEL® należy przechowywać w temperaturze od 4°C do 30°C.
- Chronić przed zamrażaniem.
- Nie narażać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredni kontakt z promieniami słońca.
- Okres przydatności wskazany na opakowaniu odnosi się do należyście przechowywanego, nieotwartego produktu.

### Producent

Bioline Products s.r.o.

Krakovská 1338/10, 110 00 Praha 1, Czechy

### Dystrybutor w Polsce

In Novation Sp. z o.o.

ul. Limanowskiego 1A/12, 32-020 Wieliczka