

Esceven (83,5mg + 50j.m.)/g, żel, 30 g

Cena: 15,20 zł



Opis słownikowy

Postać	Żel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	POZNAŃSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Esceven to lek w postaci żelu, który tradycyjnie stosowany jest w łagodzeniu objawów przewlekłej niewydolności żylną, w tym bólu, uczucia ciężkości nóg, nocnych skurczów mięśni łydek, swędzenia oraz obrzęków. Substancjami czynnymi preparatu jest wyciąg z nasion kasztanowca oraz heparyna. Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach wynika wyłącznie z długotrwałego stosowania i doświadczenia.

Wskazania

Przewlekła niewydolność żylna objawiająca się bólem, uczuciem ciężkości w nogach, nocnymi skurczami mięśni łydki, swędzeniem oraz obrzękiem.

Skład

1 g żelu zawiera:

- substancje czynne: wyciąg gęsty z nasion kasztanowca (Hippocastani seminis extractum spissum, DER 6-9:1); ekstrahent: mentanil 99% (v/v/) 83,5 mg; heparyna sodowa (Heparinum natricum) 0,42 mg (50 j.m.),
- substancje pomocnicze: karbomer, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek, etylu parahydroksybenzoesan bronopol.

Działanie

Przeciwobrzękowe, łagodzące.

Dawkowanie

- **Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia:** 1 g żelu (pasek o długości około 3-4 cm) wcierać w skórę kończyn 3 razy dziennie.

Lek należy stosować przez okres 2 tygodni. Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 tygodniach, należy skonsultować się z lekarzem, który może zalecić kontynuowanie kuracji.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na składniki produktu.
- Nie stosować:
 - na otwarte rany, błony śluzowe i w okolicy oczu,
 - w stanach przewlekłych schorzeń nerek.
- Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo, nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Działania niepożądane

- Lek Esceven jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego muszą one wystąpić.
- Po zastosowaniu leku obserwowano przejściowe uczucie ciepła, przejściowy świąd skóry o niewielkim nasileniu.

Interakcje

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich obecnie lub ostatnio stosowanych lekach, a także o tych, które pacjent zamierza stosować.
- Dotychczas nie zaobserwowano interakcji z innymi lekami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u pacjentów ze skazą krwotoczną.
- W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi lub dostania się leku do oczu, należy obficie przemyć wodą.
- W przypadku wystąpienia objawów podrażnienia takich jak zaczerwienienie, obrzęk, łzawienie, należy skontaktować się z lekarzem.
- Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo, nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.
- Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
- Lek zawiera:
 - bronopol, który może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie kontaktowe).
 - etylu parahydroksybenzoesan, który może wywołać reakcje alergiczne (możliwe typu późnego).

Podmiot odpowiedzialny

Poznańskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A.
ul. Towarowa 47/51
61-896 Poznań