

Gardlox Manusilver Spray do gardła, 30 ml



Cena: 16,24 zł

Opis słownikowy

Postać	Spray
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	S-LAB SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Gardlox Manusilver - Spray do gardła

Preparat do stosowania w celu łagodzenia objawów chorobowych górnych dróg oddechowych, takich jak: stan zapalny gardła i jamy ustnej, zapalenie migdałków, ból gardła, pieczenie i chrypka spowodowanych przez infekcje bakteryjne, wirusowe oraz grzybicze.

Opis działania:

Stosowanie preparatu zapewnia skuteczne nawilżanie błony śluzowej jamy ustnej i gardła w podrażnieniach i suchości spowodowanych działaniem zbyt niskich / wysokich temperatur, klimatyzacją, zanieczyszczeniami powietrza, a także w stanach podrażnienia więzadeł głosowych przy ich nadmiernym obciążeniu.

Poprzez tworzenie filmu ochronnego (mechanicznej bariery) na powierzchni błony śluzowej, preparat przywraca naturalną wilgotność, łagodzi obrzęk i wspomaga regenerację błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Właściwości nanocząsteczek srebra oraz miodu Manuka ograniczają rozwój drobnoustrojów

chorobotwórczych w tym bakterii, wirusów oraz grzybów.

Pomaga utrzymać prawidłowe, naturalne funkcje obronne błony śluzowej. Skutecznie poprawia jakość oddychania, pozostawiając jednocześnie uczucie lekkiego znieczulenia błony śluzowej gardła.

Skład:

Nanokoloid srebra, miód Manuka MGO 400 +, porost islandzki, hialuronian sodu, pantenol, gliceryna, glikol polipropylenowy, olejek goździkowy, olejek mięty pieprzowej, olejek eukaliptusowy, olejek tymiankowy, aromat czarnej porzeczki, sukraloza, polisorbat 20, poliheksanid, woda.

Instrukcja stosowania:

GARDLOX MANUSILVER należy stosować tylko miejscowo na błony śluzowe gardła.

1. Przed użyciem preparatu należy dokładnie umyć ręce. Przygotować aplikator. Wstrząsnąć produkt. W przypadku pierwszego użycia, należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik tak, aby wypełnił się płynem.
2. Umieścić aplikator możliwie jak najgłębiej w jamie ustnej, nacisnąć dozownik i rozpylić preparat w kierunku gardła.
3. Po zastosowaniu preparatu nie spożywać żadnych płynów przez 30 minut.
4. Zaleca się po każdym użyciu wytrzeć dozownik suchą jednorazową chusteczką lub gazikiem.

Opakowanie jednostkowe powinno być stosowane tylko przez jedną osobę.

Dawkowanie:

Preparat można stosować do 4 razy dziennie.

Dzieci od 2 roku życia:

Maksymalnie 2 rozpylenia przy jednorazowym podaniu.

Dorośli:

Maksymalnie 3-4 rozpylenia przy jednorazowym podaniu.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie wyrobu.

Środki ostrożności:

- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze od 5 C do 25 C.
- Może wystąpić naturalny osad lub zmętnienie produktu.

Opakowanie:

Butelka z atomizerem w kartoniku jednostkowym.

Opakowanie o pojemności 30 ml.