

Gastrobutin IBS 200 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 tabl. (4 blist. po 15 tabl.)



Cena: 24,88 zł

Opis słownikowy

| | |
|------------------------------------|--|
| Postać | Tabletki |
| Producent / Podmiot Odpowiedzialny | PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. |
| Przechowywanie | Temperatura pokojowa |
| Rejestracja | Suplementy diety |

Opis produktu

Gastrobutin IBS polecany jest szczególnie:

- osobom z niedoborami krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w diecie, szczególnie stosującym dietę ubogą w błonnik pokarmowy (dietę ubogoreszkową), który działa drażniąco na błonę śluzową jelit
- osobom odczuwającym dyskomfort ze strony układu pokarmowego – głównie nadwrażliwość w obrębie jelit (m. in. zespół jelita drażliwego)
- osobom stosującym dietę lekkostrawną np. podczas występowania biegunek
- jako wspomaganie uzupełnienia flory jelitowej
- po antybiotykoterapii, do stosowania również łącznie z preparatami zawierającymi probiotyki

Dawkowanie:

Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Zalecana dawka: 1 tabletki 2 razy dziennie podczas posiłku.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletek nie należy rozgryzać.

Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
Cięża i okres karmienia piersią.

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.

Składniki

Laktoza z mleka, Substancja wypełniająca - Celuloza mikrokryształiczna, Maślan sodu, Otoczka I (Substancja glazurująca - Szelak, Substancja wypełniająca - Sól karboksymetylocelulozy, Regulator kwasowości - Wodorowęglan amonu, Barwniki - Tlenki i wodorotlenki żelaza oraz Dwutlenek tytanu, Średniołańcuchowe trójglicerydy, Substancja zagęszczająca - Glicerol), Otoczka II (Substancja wiążąca - Hydroksypropylometyloceluloza, Substancja przeciwzbrylająca - Talk, Srobia modyfikowana - Poliwinylpirolidon i Hdroksypropylometyloceluloza, Substancje przeciwzbrylające - Sole magnezowe kwasów tłuszczowych i Dwutlenku krzemu.)

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zróżnicowany sposób odżywiania się jest niezbędny dla zachowania zdrowia. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.