

# GRANUDACYN, roztwór do płukania ran, 250ml.



Cena: 42,40 zł

## Opis słownikowy

Postać	Roztwór
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PGF
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### GRANUDACYN, roztwór do płukania ran, 250ml.

Wyrób medyczny Granudacyl to roztwór do płukania ran o szerokim spektrum przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym oraz przeciwgrzybiczym, dzięki czemu oczyszcza zainfekowane rany oraz zapobiega pojawieniu się lub nawrotom infekcji w ranach niezakażonych. Ponadto roztwór jest bezpieczny dla tkanek i wspomaga naturalne procesy gojenia.

### Skład

Woda, sodu chlorek, kwas podchlorawy, sodu podchloryn.

### Przeznaczenie produktu

Wyrób medyczny przeznaczony jest do stosowania na różnego rodzaju zakażone lub krytycznie skolonizowane rany, w celu ich oczyszczenia lub zapobiegania wystąpienia zakażenia. Roztworem płukać można zarówno rany przewlekłe, niezależnie od ich głębokości (np. odleżyny, owrzodzenia nóg, stopy cukrzycowej, popromienne), wszystkie rany ostre (np. ugryzienia, skaleczenia, rany szarpane lub pękające), otarcia, rany chirurgiczne (śródooperacyjne oraz pooperacyjne), rany z odsłonięciem chrząstek, kości, ścięgien, więzadeł, urazy tkanek miękkich, oparzenia I i II stopnia, przetoki, ropnie, można go stosować również w jamach ciała (np. jamie ustnej, nosie, uszach). Produkt może być także wkraplany w terapii podciśnieniowej (NPWT) oraz używany do płukania miejsca operowanego, aby nie dopuścić do zakażenia.

### Przeciwwskazania i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
- Nie podawać dożylnie, dotętniczo lub w infuzjach.
- Nie łączyć z innymi produktami do oczyszczania ran (np. enzymatycznymi środkami do oczyszczania ran).
- Nie mieszać z produktami ani substancjami chemicznymi.
- Nie zaleca się spożycia doustnego.

#### Uwagi i środki ostrożności

- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zużyć z ciągu 60 dni od pierwszego otwarcia.
- Przed użyciem można podgrzać do 37°C.