

Hasceral (100mg + 50mg)/g, maść, 50 g

Cena: 19,13 zł



Opis słownikowy

Postać	Maść
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

- Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek HASCERAL ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

HASCERAL

(Urea + Acidum salicylicum)

(100 mg + 50 mg)/g, maść

Skład

1 g maści zawiera

substancje czynne:

Mocznik (Urea) 100 mg

Kwas salicylowy (Acidum salicylicum) 50 mg

i substancje pomocnicze:

Polisorbat 40, sorbitanu trójoleinian, Simulsol 165, glicerol, wazelina biała

Jedno opakowanie leku (tuba aluminiowa) zawiera 50 g maści.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Hasceral i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Hasceral
3. Jak stosować lek Hasceral
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Hasceral
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Hasceral i w jakim celu się go stosuje

Hasceral, maść zawiera 10% mocznika i 5% kwasu salicylowego.

10% mocznik wywołuje efekt keratolityczny, co prowadzi do złuszczenia warstwy rogowej naskórka. Wpływa również na rozmiękczenie nadmiernie zrogowaciałych warstw naskórka, a także odnawia płaszcz ochronny skóry, co w znaczącym stopniu ogranicza zwrotną utratę wody przez powłoki skórne.

Kwas salicylowy w stężeniu 5 % wywołuje złuszczenie komórek naskórka. Efekt jego działania jest dwukierunkowy. Polega na redukowaniu przylegania komórek przez rozpuszczanie substancji międzykomórkowej oraz na zmniejszeniu pH w warstwie rogowej, co sprzyja nawodnieniu i zmiękczeniu naskórka. W efekcie dochodzi do utraty spójności między komórkami, ich oddzielania się i złuszczenia.

Kwas salicylowy i mocznik poprzez zmianę pH na powierzchni skóry działają również przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo.

Wskazaniami do stosowania leku Hasceral są choroby przebiegające z zaburzeniem rogowacenia naskórka takie jak rybia łuska, łuszczyca, łupież czerwony mieszkowy, nadmierne rogowacenie dłoni i stóp, rogowacenie mieszkowe, ponadto alergiczny i niealergiczny wyprysk dłoni, neurodermit, atopowe zapalenie skóry oraz stany nadmiernego wysuszenia skóry o różnej etiologii.

2. Zanim zastosuje się lek Hasceral

Nie należy stosować leku Hasceral, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Hasceral

Nie stosować na uszkodzoną skórę oraz w okolicy oczu i błon śluzowych.

Nie stosować maści na większe powierzchnie skóry, a jedynie miejscowo.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Z uwagi na wchłanianie przez skórę, preparaty zawierające kwas salicylowy nie powinny być stosowane na duże powierzchnie skóry u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Z uwagi na wchłanianie przez skórę, preparaty zawierające kwas salicylowy nie powinny być stosowane na duże powierzchnie skóry u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków

Brak danych.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Hasceral

Lek Hasceral należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Do stosowania na skórę.

Maść wcierać w zmienione chorobowo miejsca na skórze 1 do 2 razy na dobę.

Stosować przez kilka lub kilkanaście dni, przy dłuższym stosowaniu wprowadzić przerwy.

Lek zmywa się pod wpływem ciepłej wody, dlatego po umyciu należy ponownie nałożyć maść.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Hasceral jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Hasceral niż zalecana

Przy podaniu miejscowym przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne.

W przypadku pominięcia dawki leku Hasceral

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Hasceral może powodować działania niepożądane.

Zastosowanie leku zgodnie z opisanym dawkowaniem i wskazaniem nie wiąże się z istotnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Niekiedy może dojść do miejscowego podrażnienia skóry.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Hasceral mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Hasceral

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku Hasceral po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. (071) 352 95 22

Dział Informacji o Leku

tel. (022) 742 00 22