

Hascofungin 1 g/100g, krem, 30 g

Cena: 19,23 zł



Opis słownikowy

Postać	Krem
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

HASCOFUNGIN 1g/100 g krem 30 g
Ciclopirox olaminum

Hascofungin to produkt leczniczy o działaniu przeciwgrzybiczym. Zawarta w nim substancja czynna - cyklopiroks z olaminą - powoduje niszczenie komórek patogennych grzybów i drożdżaków poprzez zaburzenie ich równowagi elektrolitowej i gospodarki energetycznej. Lek posiada także właściwości przeciwbakteryjne (wobec niektórych Gram-dodatnich i Gram-ujemnych) oraz przeciwzapalne.
Wskazania:

Wszystkie postacie grzybicy skóry:

- kandydoza skóry;
- grzybica ciała, podudzi, pachwin, stóp;
- łupież pstry.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Stosowanie na otwarte lub sączące się rany, błonę śluzową, oparzenia, w okolicę oczu.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

Preparat do stosowania miejscowego.

Nanieść odpowiednią ilość kremu na zainfekowany obszar skóry oraz otaczającą go zdrową okolicę. Delikatnie wmasowywać lek do momentu całkowitego wchłonięcia. Stosować 2 razy w ciągu dnia - rano i wieczorem.
Kurację prowadzi się do czasu ustąpienia wszystkich zmian chorobowych i zwykle trwa ona 2-4 tygodnie (w przypadku grzybicy stóp - miesiąc lub dłużej).

Nie przekraczać zalecanych dawek.

Jeżeli leczenie przeciągnie się lub objawy ulegną nasileniu, należy zgłosić się do lekarza.

Działania niepożądane

Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z jego potencjalnymi interakcjami z innymi substancjami czynnymi.

Jak każdy lek, Hascofungin może powodować efekty niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Czasem mogą pojawić się podrażnienie, zaczerwienienie, świąd, orzęb, reakcja nadwrażliwości.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Skład

Substancją czynną leku jest cyklopiroks z olaminą.
100 g kremu zawiera 1 g cyklopiroksu z olaminą.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: alkohol cetostearylowy, izopropylu myrystynian, glicerolu monostearynian samoemulgujący, parafina ciekła lekka, oktylododekanol, polisorbat 60, glicerol, kwas benzoesowy, kwas mlekowy, woda oczyszczona.

Podmiot odpowiedzialny

PPF Hasco-Lek S.A., ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław