

Hascofungin 10 mg/ml, płyn do stosowania na skórę, 30 ml (but.)



Cena: 22,05 zł

Opis słownikowy

Postać	Płyn
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

HASCOFUNGIN 10 mg/ml płyn na skórę 30 ml
Ciclopirox olaminum

Hascofungin to produkt leczniczy o działaniu przeciwgrzybiczym. Zawarta w nim substancja czynna - cyklopiroks z olaminą - powoduje niszczenie komórek patogennych grzybów i drożdżaków poprzez zaburzenie ich równowagi elektrolitowej i gospodarki energetycznej. Lek posiada także właściwości przeciwbakteryjne (wobec niektórych Gram-dodatnich i Gram-ujemnych) oraz przeciwzapalne.

Wskazania

Wszystkie postacie grzybicy skóry:

- kandydoza skóry;
- grzybica ciała, podudzi, pachwin, stóp;
- łupież pstry.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Stosowanie na otwarte lub sączące się rany, błonę śluzową, oparzenia, w okolice oczu.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

Preparat do stosowania miejscowego.

Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie rozpylić lek w powietrze w celu uzyskania równomiernego strumienia.

Za pomocą aplikatora nanieść odpowiednią ilość płynu na zainfekowany obszar skóry oraz otaczającą go zdrową okolicę. Stosować 2 razy w ciągu dnia - rano i wieczorem.

Kurację prowadzi się do czasu ustąpienia wszystkich zmian chorobowych i zwykle trwa ona 2-4 tygodnie (w przypadku grzybicy stóp - miesiąc lub dłużej).

Nie przekraczać zalecanych dawek.

Jeżeli leczenie przeciągnie się lub objawy ulegną nasileniu, należy zgłosić się do lekarza.

Skład

Hascofungin płyn - składniki

1 ml płynu zawiera:

- substancję czynną: cyklopiroks z olaminą 10 mg w 1ml płynu,
- substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, makrogol 400, woda oczyszczona.

Interakcje

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Działania niepożądane:

Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z jego potencjalnymi interakcjami z innymi substancjami czynnymi.

Jak każdy lek, Hascofungin może powodować efekty niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Czasem mogą pojawić się podrażnienie, zaczerwienienie, świąd, orzęb, reakcja nadwrażliwości.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Podmiot odpowiedzialny

PPF Hasco-Lek S.A., ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław