

Heel VertigoHeel, tabletki, 50 tabl. (poj.)



Cena: 30,47 zł

Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Lek homeopatyczny

Opis produktu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Wskazania do stosowania:

Lek homeopatyczny stosowany wspomagająco w zawrotach głowy po wykluczeniu przez lekarza poważnej przyczyny dolegliwości. Produkt może być stosowany w dolegliwościach towarzyszących chorobie lokomocyjnej.

Stosowanie u dzieci:

Ze względu na brak odpowiednio udokumentowanych nadań dotyczących zastosowania leku u dzieci, lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 12. roku życia.

Ciąża i karmienie piersią:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Zanim zastosuje się lek:

Lek zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Skład:

- Coccus- Conium- Ambra- Petroleum

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

1 tabletkę podjęzykowo 3 razy dziennie. Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.
Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.
Nie przekraczać zalecanej dawki.

Zażycie większej dawki niż zalecana:

W przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie dawki.

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.

Możliwe działania niepożądane:

Nie są znane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.

Przechowywanie:

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie leku z jedzeniem i pić

Lek należy przyjmować między posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 12 roku życia.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa

tel. 022 545 07 15