


Ibesan, kapsułki miękkie, 30 kaps.

Cena: 34,78 zł



Opis słownikowy

Postać	Kapsułki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	N.P.ZDROVIT SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

- Przynosi szybką ulgę przy bolesnych objawach oraz przy gromadzeniu się gazów w układzie pokarmowym.
- Łagodzi ból brzucha w przebiegu biegunki u pacjentów z zespołem jelita drażliwego (IBS).
- Normalizuje perystaltykę i redukuje ból, zapobiegając w ten sposób niedrożności jelit.
- Składniki aktywne wyrobu to naturalna glinika mineralna (krzemian magnezowo-glinowy) oraz simetikon. Składniki te nie ulegają wchłanianiu w jelitach. Naturalna glinika mineralna absorbuje toksyny, bakterie oraz rotawirusy, uniemożliwiając im przyleganie do błony śluzowej jelit. Simetikon powoduje łatwiejsze łączenie się pęcherzyków gazów w żołądku i jelitach, co ułatwia pasaż gazów w jelitach.

Sposób użycia:

Stosowanie doustne. Zalecana dawka dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia to 2 kapsułki 3 razy dziennie przez 2-4 tygodnie. Kapsułki Ibesan powinny być przyjmowane z jedzeniem lub po posiłku. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody (ok. 200ml).

Nie należy stosować kapsułek Ibesan dłużej niż 30 dni jako jednorazową terapię. Stosowanie kapsułek można wznowić po 4 dniach przerwy w ich przyjmowaniu.

Skład:

Naturalna glinika mineralna, simetikon 50%, hydroksypropylometyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy, dwutlenek krzemu, olej z nasion słonecznika.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Ibesan należy zapoznać się z instrukcją użycia, która znajduje się wewnątrz opakowania. Ibesan to kapsułki do stosowania doustnego. Zalecana dawka dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia to 2 kapsułki 3 razy dziennie

przez 2-4 tygodnie.

Przyjmować z jedzeniem lub po posiłku. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody (ok. 200 ml).

Kapsułek nie należy żuć ani rozgryzać. Nie należy pozostawiać w ustach do rozpuszczenia. Z uwagi na obecność glinki, ostrożnie wyciskać kapsułki z blistrów.

Nie należy stosować kapsułek Ibesan dłużej, niż 30 dni jako jednorazową terapię. Stosowanie kapsułek można wznowić po 4 dniach przerwy w ich przyjmowaniu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie stosować kapsułek Ibesan w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze 5-25 .

Stosowanie wyrobu z innymi lekami

Nie należy stosować kapsułek Ibesan równocześnie z innymi lekami.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Opakowanie:

30 kapsułek

Wytwórca:

PK Benelux BV, Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL

Dystrybutor:

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.

ul. Nocznickiego 31,

01-918 Warszawa