

# Impact Oral smak waniliowy, płyn, 3 szt. po 237 ml

Cena: 39,61 zł



## Opis słownikowy

Postać	Płyn
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	NESTLE POLSKA S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

## Opis produktu

### Impact Oral smak waniliowy - płyn 3 szt. po 237 ml

#### Opis

Impact Oral to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów chirurgicznych w okresie okołoperacyjnym, np. z odleżynami czy trudno gojącymi się ranami lub w stresie metabolicznym (urazy).

Płyn Impact Oral to preparat zawierający zarówno kwasy tłuszczowe omega-3, argininę jak i nukleotydy, więc może stanowić wysokobiałkowy i wysokoenergetyczny kompletny odżywczy posiłek o smaku owoców tropikalnych.

Produkt powinien być stosowany pod kontrolą lekarza. Może być stosowany jako wsparcie żywieniowe lub jako jedyne źródło pożywienia.

Produkt bez glutenu i bez laktozy.

#### Skład

Woda, sacharoza, maltodekstryna, białka mleka, L-arginina, częściowo hydrolizowana guma guar, olej rybi, składniki mineralne (cytrynian potasu, cytrynian sodu, fosforan wapnia, chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek potasu, fosforan magnezu, cytrynian wapnia, pirofosforan żelaza (III), siarczan cynku, glukonian miedzi (II), siarczan manganu, fluorek sodu, jodek potasu, molibdenian (VI) sodu, selenian sodu (IV), chlorek chromu (III)), trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT), olej kukurydziany, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), emulgatory (E471, lecytyna sojowa), RNA wyekstrahowane z drożdży, dwuwinitian choline, witaminy (C, niacyna, kwas pantotenowy, E, B6, A, tiamina, ryboflawina, D, K, kwas foliowy, B12, biotyna), stabilizatory (E460, karagen, E466), aromaty, przeciwutleniacz (E306), barwnik (ekstrakt z papryki, beta-karoten).

Składniki mineralne	100ml	237 ml
---------------------	-------	--------

Sód	150 mg	355 mg
Chlorki	169 mg	401 mg
Potas	190 mg	450 mg
Wapń	114 mg	270 mg
Fosfor	101 mg	239 mg
Magnez	32 mg	76 mg
Żelazo	1,7 mg	4 mg
Cynk	2,1 mg	5 mg
Miedź	0,25 mg	0,59 mg
Jod	21 µg	50 µg
Selen	6,6 µg	15,6 µg
Mangan	0,3 mg	0,71 mg
Chrom	14 µg	33 µg
Molibden	22 µg	52 µg
Fluorki	0,21 mg	0,50 µg

Witaminy	100 ml	237 ml
A	139 µg	329 µg
D	0,94 µg	2,2 µg
E	4,2 mg α-TE	10 mg α-TE
K	9,4 µg	22,3 µg
C	30 mg	71 mg
B1	0,17 mg	0,4 mg
B2	0,25 mg	0,59 mg
B6 (mg)	0,21 mg	0,5 mg
Niacyna	2,2 mg/2,8 mg NE*	5,2 mg/ 6,6 mg NE*
Kwas foliowy	28 µg	66 µg
B12	0,8 µg	1,9 µg
Kwas pantotenowy	1,1 mg	2,6 mg
Biotyna	10 µg	24 µg
Cholina	38 mg	90 mg
Nukleotydy	0,18 g	0,43 g
Wartości odżywcze	100 ml	237 ml
Wartość energetyczna	606 kJ (144 kcal)	1436 kJ (341 kcal)
Tłuszcz (24% kcal) w tym:	3,9 g	9,2 g
- kwasy tłuszczowe nasycone	1,8 g	4,3 g
- MCT**	1,1 g	2,6 g
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	0,73 g	1,7 g
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	1,3 g	3,1 g
- omega-3	600 mg	1422 mg
w tym: EPA+DHA	500 mg	1185 mg
Węglowodany (53% kcal) w tym:	18,9 g	44,8 g
- cukry	11 g	26 g
- laktoza	<0,1 g	-
Błonnik (2% kcal)	1,4 g	3,3 g

Białko (21% kcal)	7,6 g	18 g
- L-arginina	1,8 g	4,3 g
Sól	0,38 g	0,9 g

Osmolarność: 680 mOsm/l

Zawartość wody: 76 g/100 ml

\*NE - ekwiwalent niacyny

\*\*MCT - trójglicerydy średniołańcuchowe

Produkt bez glutenu.

Produkt bez laktozy.

Impact Oral jest sterylizowany UHT.

#### Masa netto

3 x 237 ml

#### Właściwości

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w formie wysokobiałkowego i wysokoenergetycznego płynu.

Może być stosowany jako wsparcie żywieniowe lub jako jedyne źródło pożywienia.

Produkt wspiera układ odpornościowy (immunożywienie).

Zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, argininę, nukleotydy i nukleotydy.

Sterylizowany UHT.

Produkt nie zawiera glutenu, laktozy.

Zawiera dodatek błonnika.

#### Przeznaczenie

Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu lub ryzyku niedożywienia u pacjentów chirurgicznych w okresie okołoperacyjnym.

#### Sposób użycia

Przed użyciem należy wstrząsnąć.

Najlepiej spożywać schłodzony.

Zalecana dzienna dawka: 3 opakowania jako uzupełnienie diety przez 7 dni przed operacją.

Następnie zgodnie z zaleceniami lekarza lub jeśli występuje niedożywienie należy stosować 4 do 5 opakowań dziennie przez kolejne 7 dni po operacji.

#### Przeciwwskazania i środki ostrożności

Stosować pod kontrolą lekarza.

Produkt podaje się doustnie.

Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.

Nieodpowiedni dla pacjentów z ciężką postacią posocznicy.

Produkt odpowiedni tylko dla dorosłych. Nie stosować u dzieci.

Nie stosować pozajelitowo.

Zawiera białka mleka, olej rybi oraz lecytynę sojową.

Produkt bez glutenu.

Produkt bez laktozy.

Sterylizowany UHT.

Zamknięty produkt przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Spożyć zaraz po otwarciu lub niewykorzystaną porcję szczelnie zamknąć, przechowywać w lodówce, zużyć w ciągu 24 godzin

#### Producent

NESTLE

Domaniewska 32

Warszawa

