

Jodyna 3 %, roztwór na skórę, 10 g



Cena: 2,18 zł

Opis słownikowy

Postać	Roztwór
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	FARMINA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Jodyna
Iodi solutio spirituosa FP
roztwór na skórę 3%
10g
Produkt leczniczy

Jodyna to lek stosowany od wielu lat jako skuteczny środek do dezynfekcji skóry i błon śluzowych. Jod jest silnym środkiem o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i przeciwwirusowym.
Lek dostępny bez recepty.

Wskazania: dezynfekcja skóry i otarć naskórka.

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników leku.

Interakcje z innymi lekami:

Może zaburzać badania czynności tarczycy, nie stosować ze związkami rtęci.

Działania niepożądane:

Miejscowe odczyny alergiczne. Przy stosowaniu na duże powierzchnie może wystąpić obrzęk skóry, wykwity o charakterze trądziku. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na etykiecie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

Chronić oczy. Ostrożnie przy przerwaniu ciągłości skóry, chorobach tarczycy. Nie

stosować na duże powierzchnie ciała.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

O stosowaniu leku w okresie ciąży i karmienia piersią decyduje lekarz.

Skład: jod, jodek potasu, etanol (96%), woda oczyszczona.

Sposób użycia: zewnętrźnie. Przecierać skórę wacikiem nasączonym preparatem.

Przechowywanie

Nie stosować po upływie terminu ważności. Przechowywać w temperaturze do 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie nr IL-4842/ChF

Podmiot odpowiedzialny: Farmina sp. z o.o. ul. Lipska 44, 30-721 Kraków.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.