

Jodyna 3 %, roztwór na skórę, 20 g (but.)



Cena: 4,54 zł

Opis słownikowy

| | |
|--|--|
| Postać | Roztwór |
| Producent / Podmiot Odpowiedzialny | FARMINA SP. Z O.O. |
| Przechowywanie | Temperatura pokojowa |
| Rejestracja | OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty |

Opis produktu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce.

Nazwa:

Jodyna

Nazwa powszechnie stosowana

Iodi solutio spirituosa

Postać: Roztwór na skórę, 3 %.

Zawartość w opakowaniu: 10 g; 20 g

Skład:

Produkt zawiera:

- Iodum 3,00 g
- Potasu jodek 1,00 g
- Etanol 96% 90,00 g
- Woda oczyszczona 6,00 g

Wskazania do stosowania:

Zewnętrznie w niewielkich uszkodzeniach skóry, takich jak otarcia, zadrapania oraz w celu odkażenia nieuszkodzonej skóry, np. przed zabiegami.

Przeciwwskazania:

Odczyny alergiczne na jod, ciąża, laktacja. Dzieci w wieku noworodkowym i

niemowlęcym, nietolerancja glutenu (choroba Duhringa).

Interakcje:

Może zaburzać badania czynności tarczycy, nie stosować ze związkami rtęci.

Działania niepożądane:

Miejscowe odczyny alergiczne. Przy stosowaniu na duże powierzchnie może wystąpić obrzęk skóry, wykwity o charakterze trądziku.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na etykiecie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

Chronić oczy. Ostrożnie przy przerywaniu ciągłości skóry, chorobach tarczycy. Nie stosować na duże powierzchnie ciała.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

O stosowaniu leku w okresie ciąży i karmienia piersią decyduje lekarz.

Droga podania i sposób stosowania:

Otarte miejsca i bezpośrednie okolice ran przemywać 2-3 razy dziennie wacikiem nasączonym lekiem. Nie stosować na otwarte rany.

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić od światła.

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Kategoria dostępności:

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

Wytwórca

Laboratorium Farmaceutyczne Avena Sp. z o.o.

ul. Leśna 42

86-031 Osielsko

Numer pozwolenia:

IL – 3130/ChF