

Keloptin, krem, 10 amp. po 3 ml

Cena: 39,84 zł



Opis słownikowy

Postać	Krem
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

KELOPTIN

Dzięki właściwościom chelatującym żelazo, Keloptin zalecany jest w leczeniu wszelkich zmian troficznych skóry

- Ilość: **10 sterylnych ampulek po 3 ml**
- Postać farmaceutyczna: **krem**

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

INFORMACJE DLA PACJENTA

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Informacje dodatkowe

SPOSÓB UŻYCIA:

- Przed każdorazowym zastosowaniem preparatu Keloptin, należy oczyścić skórę solą fizjologiczną.

- Ilość naniesionego preparatu i częstość stosowania zależą od stanu klinicznego zmian skórnych i czasu wchłaniania kremu.
- **Zaleca się stosowanie przynajmniej dwa razy dziennie**

Wskazania

Miejscowe leczenie skórno-naskórkowych zmian przebarwieniowych, w tym: wybroczyn i krwiaków pooperacyjnych, hemosyderynowych przebarwień powstających po skleroterapii; profilaktyka owrzodzeń żylnych zależnych od poziomu żelaza, owrzodzeń żyłakowatych, odleżyn, pęknięć, poparzeń, blizn, a także w postępowaniu po zabiegach z użyciem lasera (do depilacji, ablacyjny, nieablacyjny). Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na składniki preparatu.
Stosowanie w tym samym czasie kremów i/lub podobnych produktów na tej samej części ciała może powodować brak skuteczności działania preparatu Keloptin albo wpływać na bezpieczeństwo jego stosowania. Nie łykać.

Skład

glikol polietylenowy 400 (PEG 400), glikol polietylenowy 1500 (PEG 1500), glikol polietylenowy 4000 (PEG 4000), laktoferyna (LT), sorbitol, gliceryna, alantoina, tokoferol

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych i źródeł ciepła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie łykać. Nie stosować po upływie terminu ważności i w przypadku uszkodzenia opakowania.

Podmiot odpowiedzialny

Solinea Sp. z o. o. Sp. K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn