

# Koszyczek arniki 1 g/g, ziola do zaparzania, 25 g



Cena: 6,40 zł

## Opis słownikowy

Postać	Ziola do zaparzania
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ZAKŁ. ZIELARSKI "KAWON-HURT" NOWAK SP.J.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Produkty lecznicze ziola

## Opis produktu

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

**Arnicae anthodium - 1g/g, ziola do zaparzania**

**Zawartość opakowania:** 25 g

**Skład:** 1 g produktu zawiera 1 g koszyczka arniki (*Arnica chamissonis* Less., anthodium).

**Wskazania do stosowania:** Napar stosowany jest jako środek przeciwzapalny do okładów na obrzęki i krwiaki po urazach. Ponadto w stanach zapalnych skóry jako środek gojący.

**Przeciwwskazania:** Uczulenie na arnikę lub inne rośliny z rodziny astrowatych (*Asteraceae = Compositae*).

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:** Nie stosować na otwarte rany. Jeżeli objawy nie ustępują lub nasilą się w czasie stosowania produktu należy skontaktować się z lekarzem.

**Interakcje:** Nie zgłaszano.

**Działania niepożądane:** Przy stosowaniu naparu na większą powierzchnię ciała może nastąpić podwyższenie temperatury lub zapalenie kontaktowe skóry.

## Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309), <https://smz.ezdrowie.gov.pl>. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

**Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią:** Ze względu na brak wystarczających danych stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią nie jest zalecane.

**Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn:** Nieistotny.

**Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:** Stosowanie tylko na skórę. **Dorośli:** 4 łyżki (4 g) surowca zaparzyć w 1 szklance (200 ml) wrzącej wody. Naparu używać do okładów. Można również przygotować okłady z naparu z 4 łyżek surowca w 2 szklankach wody, 50g gliceryny i łyżeczki octu.

**Zastosowanie większej niż zalecana dawka:** W razie zastosowania dawki większej niż zalecana i wystąpienia niepokojących objawów, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

*W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania produktu leczniczego należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.*

**Warunki przechowywania:** Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności.

**Kategoria dostępności:** OTC - Lek wydawany bez recepty