

Lehning Fucus Complexe Nr 111, tabletki, 80 tabl. (4 blist. po 20 tabl.)



Cena: 27,58 zł

Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	LEHNING LABORATOIRES
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Lek homeopatyczny

Opis produktu

Fucus Complexe Lehning Nr 111 - tabletki 80 tabl.

Wskazania: Otyłość prosta, a także na tle niedoczynności tarczycy z wolem mięszzowym jak i bez wola, zaparcia, zaburzenia metaboliczne.

Jest bezpieczny i dobrze tolerowany, zmniejsza apetyt, może być stosowany w przewlekłych kuracjach, po uzyskaniu spadku wagi ułatwia jej utrzymanie.

Polecany przy:

- otyłości
- skłonności do tycia,
- niedoczynności tarczycy z wolem mięszzowym, jak i bez wola,
- nadmiernym apetycie,
- zaburzeniach przemiany materii,
- zaparciach.

Nasz sposób na nadwagę.

Jest bezpieczny i dobrze tolerowany, zmniejsza apetyt, może być stosowany w przewlekłych kuracjach, po uzyskaniu spadku wagi ułatwia jej utrzymanie.

Dawkowanie: Przeciętnie, jeżeli lekarz nie zaleci inaczej : 4 x dziennie 1 tabletki do ssania, przyjmować na min. 30min. przed posiłkami, lub 1 godz. po posiłku.

Zaleca się przewlekłe kuracje 3 – 4 miesięczne, najlepiej na wiosnę i na jesieni.

Opakowanie: 80 tabletek.

Postać leku: Tabletki

Skład:

1 tabletkę 0,25 g zawiera: Fucus vesiculosus D2, Antimonium crudum D2, Alchemilla vulgaris D2, Thyroidinum D8, Calcarea acetica D2 aa 0,045 g, Vehiculum ad 0,25 g.

Informacje: Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego.

Przeciwwskazania

Kiedy nie należy stosować leku homeopatycznego Lehning Fucus complexe Nr 111:

- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.
- jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie leku z jedzeniem i pić

Lek należy stosować między posiłkami, z zachowaniem odstępów 1/2 godziny przed lub 1 godziny po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku u dzieci.

Producent

LEHNING