

Lehning Santaherba, krople doustne, roztwór, 30 ml

Cena: 24,15 zł



Opis słownikowy

Postać	Krople
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	LEHNING LABORATOIRES
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Lek homeopatyczny

Opis produktu

Santaherba krople doustne, roztwór

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Santaherba i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Santaherba
3. Jak stosować lek Santaherba
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Santaherba
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Santaherba i w jakim celu się go stosuje

Santaherba jest lekiem stosowanym wspomagająco w katarze siennym.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Santaherba

Kiedy nie stosować leku Santaherba

Jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek z substancji czynnych lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci poniżej 12 lat po konsultacji lekarskiej.

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku 2–5 lat.

Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

Lek Santaherba a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami są nieznane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na zawartość etanolu, preparat zwłaszcza przyjęty w dawce większej niż zalecana, może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Santaherba

Lek zawiera 39,5% v/v etanolu, tzn. do 234 mg na średnią dawkę dla dorosłych (30 kropli), co jest równoważne 5,8 ml piwa lub 2,3 ml wina. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

3. Jak stosować lek Santaherba

Dorośli: 3 razy dziennie po 30 kropli.

Młodzież od 12 do 18 lat: 3 razy dziennie po 15 kropli.

Dzieci od 6 do 11 lat: po konsultacji z lekarzem. Zwykle stosuje się ½ - ¼ dawki dla dorosłego; jeśli lekarz nie zaleci inaczej: 10 kropli 3 razy dziennie.

Dzieci poniżej 2 lat: nie stosować.

U dzieci podawać lek nie częściej, niż co 4 godziny i nie stosować dłużej niż zalecił lekarz.

Sposób stosowania

Odpowiednią ilość kropli rozpuścić w niewielkiej ilości przegotowanej, chłodnej wody.

Lek należy stosować między posiłkami, z zachowaniem odstępów ½ godziny przed lub 1 godziny po posiłku. Przed połknięciem, należy przetrzymać chwilę pod językiem. Najlepiej stosować lek regularnie, o tych samych porach każdego dnia.

Czas stosowania

Nie zaleca się stosowania dłużej niż 5 dni bez konsultacji lekarskiej. Skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują po 5 dniach leczenia.

W przypadku wrażenia, że lek nie działa lub działa za słabo, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Santaherba

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Santaherba

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Santaherba

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Do dnia sporządzenia ulotki nie odnotowano żadnych działań niepożądanych leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane należy powiedzieć o nich lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do krajowego systemu zgłaszania:
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie gromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leków.

5. Jak przechowywać lek Santaherba

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Santaherba

100 ml kropli zawiera:

Substancje czynne:

- Yerba santa D3 3,33 ml
- Ipeca D4 3,33 ml
- Lobelia inflata D3 3,33 ml
- Adrenalinum D6 3,33 ml
- Belladonna D4 3,33 ml
- Stramonium D4 3,33 ml
- Solidago virga aurea D3 3,33 ml
- Ephedra vulgaris D4 3,33 ml
- Galeopsis ochroleuca TM 3,33 ml
- Sambucus nigra TM 3,33 ml
- Crataegus oxyacantha TM 3,33 ml.

Lek zawiera 39,5 % v/v etanolu.

Substancje pomocnicze: woda, etanol

Zawartość leku w opakowaniu: 30 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratoires Lehning
3 rue du Petit Marais
57640 Sainte-Barbe, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:

Polska
RUSTIKA Sp. z o.o.
ul. Wilcza 69
00-679 Warszawa
tel.: 022 621 19 74