

Lehning Urarhone, płyn doustny, 250 ml



Cena: 30,01 zł

Opis słownikowy

Postać	Płyn
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	LEHNING LABORATOIRES
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Lek homeopatyczny

Opis produktu

Lehning Urarhone jest lekiem homeopatycznym w postaci płynu doustnego stosowanym jako uzupełnienie leczenia w bólach reumatycznych i dnie moczanowej.

Skład

Składniki		250 ml płynu
Colchicum	D8	1,25 ml
Dulcamara	D8	2 ml
Kalium iodatum	D8	1,25 ml
Aqua silicata	D4	12,5 ml
Sulfur	D4	5 ml
Natrium salicylicum	D8	12,5 ml
Mercurius corrosivus	D10	1,25 ml
Bryonia alba	D8	1,25 ml
Viscum album	D3	3,75 ml
Aurum muriaticum natronatum	D8	0,62 ml
Betula alba	TM	5 ml

Lek zawiera 22% v/v etanolu.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania leku:

Dorośli: doustnie, 2-3 razy dziennie po 1 łyżce stołowej.

Odpowiednią ilość płynu rozpuścić w niewielkiej ilości przegotowanej, chłodnej wody. Lek należy stosować między posiłkami, z zachowaniem odstępów 1/2 godziny przed lub 1 godziny po posiłku.

Najlepiej stosować lek regularnie, o tych samych porach każdego dnia. Maksymalny czas stosowania leku to 3 tygodnie.

Wskazania

Preparat jest lekiem homeopatycznym w postaci płynu doustnego stosowanym jako uzupełnienie leczenia w bólach reumatycznych i dnie moczanowej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie należy stosować leku homeopatycznego Lehning Urarhone

jeśli stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku

jeżeli stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów wówczas należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

u pacjentów z chorobą alkoholową.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek: u osób z niewydolnością wątroby, u osób z padaczką.

Lek zawiera etanol. 1 maksymalna dawka zawiera do 2850 mg etanolu, co jest równoważne 72,0 ml piwa lub 30,0 ml wina. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Lek zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u osób z nietolerancją niektórych cukrów

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku u dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ze względu na zawartość etanolu (22% v/v), preparat zwłaszcza przyjęty w dawce większej niż zalecana, może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Producent

LEHNING

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25°C.