

Lehning Voxpax, tabletki, 60 tabl.



Cena: 25,60 zł

Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	LEHNING LABORATOIRES
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Lek homeopatyczny

Opis produktu

Voxpax - tabletki 60 tabl.

DLA Dorosłych

ZASTOSOWANIE Ból gardła, utrata głosu
POLECANY PRZY Chrypce

POSTAĆ LEKU Tabletki

Wskazania: Bóle gardła, chrypka, przejściowa utrata głosu. Ostre i podostre stany zapalne gardła, krtani, tchawicy, w trakcie których występują bóle gardła, kaszel, chrypka, utrata głosu. Nadwyręzenie i dolegliwości ze strony strun głosowych u mówców, śpiewaków. Przewlekły nieżyt gardła u palaczy.

Lek ten działa pobudzająco na układ immunologiczny w przebiegu umiejscowionych stanów zapalnych błon śluzowych układu oddechowego, trawiennego i moczopłciowego, a także w procesach ostrych i przewlekłych toczących się w obrębie skóry i tkanki podskórnej.

Polecany przy :

bólach gardła,
chrypce,
przejściowej utracie głosu,
ostrym i podoстрыm zapaleniu gardła,
ostrym i podoстрыm zapaleniu krtani,
ostrym i podoстрыm zapaleniu tchawicy,
nadwyręzeniu strun głosowych,
przewlekłych nieżytach gardła u palaczy.

Działanie: Lek działa stymulująco na mechanizmy obronne organizmu w przypadkach zlokalizowanych stanów zapalnych, dotyczących górnych jak również dolnych dróg oddechowych.

Dawkowanie: Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej: dorośli 4 – 5 x dziennie 2 tabletki do ssania , między posiłkami. Dzieci-zgodnie z zaleceniem lekarza.

Opakowanie: 60 tabletek

Postać leku : Tabletki

Skład: 1 tabletką 0,5g zawiera:Arum triphyllum D4 0,060g, Pimpinella anisum D4 0,060g, Carbo vegetabilis D4 0,060g, Hepar sulfuris calcareum D5 0,060g, Manganum peroxydatum D8 0,060g, Olibanum D6 0,060g, Arsenicum album D8 0,060g, Sisymbrium officinale D4 0,060g.

Substancje pomocnicze: Stearynian magnezu, skrobia ryżowa.

Lek zawiera laktozę i sacharozę.

Można stosować równolegle z : L. 52 lub z Phytotuxem.

Informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego.

Pamiętaj :

- suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety
- nie używaj preparatu jeśli upłynął termin ważności podany na opakowaniu
- przechowuj leki w miejscu niedostępnym dla dzieci

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się przyjmowania leku przez dzieci.

Podmiot odpowiedzialny

Lehning