

Maalox 400mg + 400mg, tabletki, 40 tabl. (4 blist. po 10 tabl.)



Cena: 19,25 zł

Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	OPELLA HEALTHCARE POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Maalox tabletki to produkt leczniczy do stosowania w leczeniu objawowym nadkwaśności, zgadze, nieżycie żołądka.

Skład

Substancjami czynnymi są: wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu.

1 tabletkę zawiera 400 mg wodorotlenku glinu, 400 mg wodorotlenku magnezu.

Substancje pomocnicze: mannitol, sorbitol, sacharyna sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, sacharoza zawierająca 3% skrobi, sacharoza.

1 tabletkę zawiera 150 mg sacharozy.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

1-2 tabletki należy ssać lub żuć po posiłku lub w czasie bólu.

Działanie

Maalox posiada działanie zobojętniające, ściągające, osłaniające błonę śluzową żołądka i dwunastnicy. Maalox nie wpływa bezpośrednio

na wydzielanie kwasu solnego w żołądku, obniża stężenie kwasu w świetle przełyku.

Wskazania

Maalox jest wskazany w leczeniu objawowym nadkwaśności i dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego jak:
nieżyt żołądka,
zarzucanie wsteczne treści żołądka do przełyku w przebiegu przepukliny rozworu przełykowego przepony,
niestrawność, zgaga z powodu nadkwaśności.

Maalox może być stosowany pomocniczo w leczeniu:

- choroby wrzodowej dwunastnicy,
- choroby wrzodowej żołądka.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Maalox:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne oraz inne substancje pomocnicze w leku,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- biegunki lub zaparcia.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- nudności, wymioty, jasne zabarwienie stolca,
- hipermagnezemia.

Częstość nieznaną:

- reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy),
- hiperaluminemia,
- hipofosfatemia,
- ból brzucha.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność w stosowaniu Maaloxu u pacjentów z niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializie, u dzieci poniżej 6 lat (stosować jedynie po konsultacji z lekarzem), u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie produktu u małych dzieci może prowadzić do hipermagnezemii.

Produktu nie należy stosować długotrwale.

Maalox zawiera sacharozę (wskazówka dla chorych na cukrzycę) oraz sorbitol (nie stosować u pacjentów, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Maalox należy zażywać nie wcześniej niż 2 godziny po zażyciu innego leku (w przypadku fluorochinolonów - ponad 4 godziny) lub 1-2 godziny przed przyjęciem innego leku.

Maalox może wchodzić w interakcje z:

- fluorochinolonami, tetracyklinami, linkozamidami,
- lekami blokującymi receptor H₂,
- atenololem, propranololem,
- digoksyną,
- ketokonazolem,
- glikokortykosteroidami,
- lewotyroksyną,
- rosuwastatyną,
- salicylanami,

solami żelaza.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Lek stosować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa