

# Magnezu siarczan, proszek do sporządzania roztworu, 50 g

Cena: 8,74 zł



## Opis słownikowy

Postać	Proszek
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

## Opis produktu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

### Wskazania do stosowania:

Lek stosuje się doustnie w postaci roztworu jako osmotyczny środek przeczyszczający w zaparciach.

### Sposób użycia:

Jako środek przeczyszczający 10g - 15g (1 łyżkę) rozpuścić w szklance wody i wypić.

Jako środek żółciopędny 0.5g - 1g 3 razy dziennie.

### Przeciwwskazania:

Hipermagnezemia, nadwrażliwość na magnez, niedrożność jelit, niewydolność nerek, blok przedsionkowo-komorowy, znaczne niedociśnienie tętnicze, miastenia (myasthenia gravis).

### Środki ostrożności

W przypadku występowania w przeszłości chorób nerek, należy przed zastosowaniem zasięgnąć

opinii lekarza. Pacjenci z zaburzeniami rytmu serca powinni przed zastosowaniem leku skontaktować się z lekarzem.

#### **Interakcje:**

Lek może zmniejszać wchłanianie doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny, tetracyklin, bisfosfonianów, związków wapnia, fluoru oraz preparatów żelaza. Zaleca się zachowanie co najmniej 3 godzinnej przerwy między przyjmowaniem siarczanu magnezu i wymienionymi lekami.

#### **Ciąża i karmienie piersią:**

Stosować wyłącznie pod kontrolą lekarza.

#### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:**

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

#### **Możliwe działania niepożądane:**

Niekiedy mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, biegunka. W przypadku długotrwałego stosowania mogą wystąpić objawy przedawkowania związane z zaburzeniem równowagi wodno-elektrolitowej. W razie wystąpienia objawów przedawkowania należy zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl). Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

**Rodzaj** Leki

**Forma** Inne

**Opakowanie** 25 g, 50 g, 100 g

**Kategoria dostępności** Leki bez recepty

**Pozwolenie** nr IL-1191-ChF

**Przechowywanie**

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.