

Maltan 300 mg/g, maść, 40 ml (tub.)



Cena: 20,74 zł

Opis słownikowy

| | |
|--|----------------------|
| Postać | Maść |
| Producent / Podmiot Odpowiedzialny | MASTERS SP. Z O.O. |
| Przechowywanie | Temperatura pokojowa |
| Rejestracja | Kosmetyk |

Opis produktu

Maltan 0,3 g/g maść 40 ml (tub.)

Maść do pielęgnacji brodawek sutkowych w okresie ciąży i karmienia piersią

SKŁADNIKI: Aqua, Glucose, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Paraffin Wax, Glyceryl Oleate, Propylene Glycol.

Działanie: Maść do pielęgnacji brodawek sutkowych w okresie ciąży i karmienia piersią zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry i ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Maltan to preparat zawierający bezpieczną substancję, glukozę, która w zależności od stężenia wykazuje działanie hamujące na rozwój bakterii. Maltan zapobiega stanom zapalnym piersi.

Maść nie zawiera substancji zapachowych i konserwujących, co ogranicza możliwość wystąpienia reakcji alergicznych.

Przeznaczenie: Codzienna pielęgnacja skóry podrażnionej i wrażliwej piersi i sutków w okresie laktacji. Maltan stosuje się przy podrażnieniach i otarciach w okresie karmienia piersią, a także w celu „hartowania” brodawek przed porodem.

Systematyczne stosowanie maści Maltan zachęca niemowlę do ssania piersi

Preparat stosuje się w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

W celu prawidłowego przygotowania brodawek sutków do okresu karmienia preparat należy stosować na dwa miesiące przed planowanym porodem (hartowanie brodawek sutkowych).

Sposób użycia: W okresie laktacji, po każdym karmieniu, zaleca się stosowanie okładów na sutki z jałowej gazy lub ochraniaczy sutkowych zawierających 2-3 cm maści. Nadmiar maści usunąć.

Przeciwwskazania: Działań niepożądanych nie stwierdzono. Nie ma przeciwwskazań, specjalnych ostrzeżeń i zalecanych środków ostrożności podczas

stosowania preparatu. Jednakże w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy niezwłocznie zaprzestać stosowania. Składniki preparatu nie mają ujemnego wpływu na przewód pokarmowy i skórę niemowlęcia.

Preparatu nie należy używać po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, tj 15°C - 25° C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dostępne opakowania:

tuba aluminiowa 40 g.

Producent: Masters Sp. z o.o.

61-345 Poznań, ul. Masztowa 3

Dystrybutor: Miralex Sp. z o.o.

61-465 Poznań, ul. Św. Szczepana 25

tel. +48 61 832 90 74