

Medixil Normal Antyperspirant roll-on, płyn, 30 ml

Cena: 27,83 zł



Opis słownikowy

Postać	Roll-on
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ASPEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Kosmetyk

Opis produktu

Opis:

Właściwości i zastosowanie:

MEDIXIL to linia specjalistycznych antyperspirantów, których receptura oparta jest na wyjątkowej formule DryPlus, zapewniającej skuteczną i długotrwałą ochronę przed nadmiernym poceniem i nieprzyjemnym zapachem potu. Medixil posiada międzynarodowy certyfikat bezpieczeństwa Allergy Certified.

Linia antyperspirantów Medixil została opracowana w taki sposób aby zapewnić maksymalną ochronę przed potem i jego nieprzyjemnym zapachem, w zależności od stopnia natężenia problemu i rodzaju skóry.

MEDIXIL® Normal - rekomendowany do skóry normalnej, dla osób z dokuczliwą, nadmierną potliwością. Ochrona przed nadmiernym poceniem minimum 3 – 5 dni.

Składniki aktywne:

Chlorek glinu / Aluminium chloride/ - uznawany jest za najskuteczniejszy składnik stosowany w profesjonalnych antyperspirantach, który znacznie redukuje ilość wydzielanego potu przez gruczoły potowe pod pachami.

Alantoina – nawilża, regeneruje i chroni skórę przed podrażnieniami.

Chlorek glinu w wodno alkoholowej bazie dezynfekuje i odtłuszcza skórę - ograniczając powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Baza wodna oraz zawarta w składzie Alantoina redukuje ryzyko powstawania podrażnień skóry, często występujących po zastosowaniu innych antyperspirantów, których formuła oparta jest wyłącznie na bazie alkoholowej.

Zawiera składniki przeciwbakteryjne o naturalnym działaniu konserwującym. Nie zawiera substancji zapachowych, sztucznych barwników i olejków eterycznych.

Sposób działania:

Medixil skutecznie zmniejsza nadmierną aktywność gruczołów potowych oraz niweluje nieprzyjemny zapach potu, aby skóra pozostawała sucha i bezwonna.

Medixil zapewnia komfort i uczucie świeżości przez 3 – 5 dni po jednorazowym zastosowaniu, jednocześnie pielęgnując skórę.

UWAGA!

Nie należy stosować preparatu przez 48 godzin po goleniu /depilacji włosów lub na skórę uszkodzoną lub podrażnioną /egzema/. W przypadku skóry uszkodzonej lub podrażnionej należy odczekać do momentu, aż naskórek w pełni się odbuduje. Przed każdym użyciem skóra pod pachami musi być czysta i całkowicie sucha.

Sposób użycia:

- Medixil jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę pod pachami.
- Rozpoczynając stosowanie antyperspirantów MEDIXIL należy nałożyć preparat na noc (przed położeniem się spać, kiedy gruczoły potowe są najmniej aktywne), na czystą, całkowicie suchą, nieuszkodzoną i niepodrażnioną skórę.
- Nałożyć 4 cienkie warstwy preparatu pod każdą pachę (2 obroty kulki ruchem w górę i 2 obroty kulki ruchem w dół).
- Po aplikacji należy odczekać do momentu aż preparat całkowicie wchłonie się w skórę, do momentu aż skóra będzie sucha.
- Rano należy zmyć ze skóry pozostałość preparatu używając wody z mydłem.

Wskazówki dla osób, które używają profesjonalnych Antyperspirantów Medixil Roll - On po raz pierwszy:

- Jeżeli używasz antyperspirantów Medixil po raz pierwszy należy mieć na uwadze, że skóra musi przyzwyczać się do działania preparatu. W tym czasie może sporadycznie wystąpić swędzenie lub podrażnienie skóry pach.
- Rozpoczynając stosowanie należy nakładać preparat co drugi dzień na noc, przed snem.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy wydłużyć ilość dni pomiędzy każdą kolejną aplikacją, według własnego uznania, z uwzględnieniem reakcji skóry na częstotliwość aplikacji.
- Kiedy nastąpi zauważalne zmniejszenie intensywności pocenia (zazwyczaj po okresie 1 – 2 tygodni), należy stosować preparat co trzecią noc, lub tak często jak zaistnieje potrzeba.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry, celem jego złagodzenia, zaleca się użycie organicznego olejku ze słodkich migdałów, po każdej aplikacji, kiedy preparat wchłonie się w skórę. Jeśli podrażnienie skóry nie ustąpi po 3 - 4 aplikacjach należy przerwać stosowanie preparatu.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować antyperspirantu Medixil na, swędzącą, zaczerwienioną podrażnioną lub uszkodzoną skórę.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Pieczenie lub swędzenie skóry po użyciu preparatu może wystąpić jeśli:

- Skóra pod pachami nie była całkowicie czysta lub sucha.
- Przed aplikacją skóra pod pachami była podrażniona lub uszkodzona.
- Zastosowano zbyt dużo produktu lub po aplikacji preparat nie wchłonał się całkowicie w skórę.
- Po aplikacji, poczekaj do całkowitego wchłonięcia preparatu zanim skóra wejdzie w kontakt z odzieżą. W razie potrzeby unieś ręce w górę i poczekaj do momentu całkowitego wyschnięcia preparatu.

Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Unikać kontaktu preparatu z biżuterią i powierzchniami metalowymi.

W sporadycznych przypadkach wystąpienia reakcji alergicznych należy zaprzestać stosowania preparatu.

Sposób przechowywania:

Przechowywać w temperaturze 5-25 stopni °C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.