

NaCl 0,9% Symphar, roztwór, 50 amp. po 5 ml

Cena: 13,54 zł



Opis słownikowy

Postać	Ampułki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SYMPHAR SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdy ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

SYMPHAR - NaCl 0,9%, roztwór soli fizjologicznej to sterylny, fizjologiczny roztwór chlorku sodu.

Składniki:

0,9 g chlorku sodu, woda oczyszczona w ilości wystarczającej do 100 ml.

Produkt nie zawiera konserwantów.

Wskazania i działanie:

- Produkt przeznaczony zarówno dla dorosłych, dzieci i niemowląt.
- Fizjologiczny roztwór chlorku sodu zalecany jest w pielęgnacji i higienie suchego lub niedrożnego nosa, w higienie oczu, uszu, do przemywania ran lub do inhalacji.

Przeciwwskazania:

W przypadku pierwszego użycia (inhalacja) lub nadwrażliwości dróg oddechowych należy skontaktować się z lekarzem.

W ciągu 10 minut po płukaniu nosa należy unikać gwałtownego wydmuchiwanie nosa.

Unikać kontaktu ampułki z powierzchnią oka lub rany.

Produkt jednorazowego użytku, niewykorzystaną zawartość ampułki należy wyrzucić.

Nie używać do iniekcji.

Dawkowanie i sposób stosowania:

- Higiena nosa: (zakraplanie lub płukanie) odchylić głowę do tyłu, wprowadzić końcówkę ampułki do nozdrza i lekko ścisnąć. Czynności powtórzyć z drugim nozdrzem. Przechylić głowę do przodu i wytrzeć nadmiar spływającej wydzieliny. Zakrapiając produkt niemowlętom należy używać minimalnego nacisku.
- Higiena oczu: (zakraplanie, przemywanie, płukanie) wcisnąć kolka kropli roztworu do każdego oka, nadmiar wytrzeć sterylnym wacikiem. Roztwór może być stosowany także przez osoby noszące soczewki kontaktowe.
- Higiena uszu: (płukanie) stosować po użyciu środka powierzchniowo czynnego, aby usunąć rozpuszczony osad woskowiny. Jedna ampułka może zostać użyta do obu uszu. Nadmiar płynu wytrzeć wacikiem.
- Przemycanie ran: Przepłukać ranę całą zawartością ampułki. Nadmiar roztworu ze zdrowej części skóry wytrzeć wacikiem.
- Inhalacja w terapii aerozolowej: czynności wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia do inhalacji lub do terapii aerozolowej.

Ważne informacje:

Nie stosować po upływie terminu ważności lub gdy ampułka uległa uszkodzeniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Jeśli konieczne jest zastosowanie innych produktów do oczu, należy je podać minimum 15 minut po aplikacji wyrobu Symphar.

Producent:

SymPhar Sp. z o.o.
Koszykowa 65
00-667 Warszawa