

Paragrippe, tabletki, 60 tabl.



Cena: 17,60 zł

Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	BOIRON S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Lek homeopatyczny

Opis produktu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Boiron Paragrippe to preparat homeopatyczny stosowany wspomagająco w objawach infekcji grypowych.

Skład:

Substancje czynne (w 1 tabletkce):

- Arnica montana 4 CH - 0,6 mg
- Belladonna 4 CH - 0,6 mg
- Eupatorium perfoliatum 4 CH - 0,6 mg
- Gelsemium sempervirens 4 CH - 0,6 mg
- Sulfur 5 CH - 0,6 mg

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, laktoza.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza.

Podawać doustnie.

Dorośli i dzieci w wieku od 12 roku życia: od momentu wystąpienia pierwszych objawów świadczących o infekcji grypowej, ssać powoli po 2 tabletki do 3 razy dziennie, wydłużając przerwy w miarę następowania poprawy.

Dzieci poniżej 12 roku życia: według wskazań lekarza.

Ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia, *dzieciom w wieku do 6 roku życia* zaleca się rozdrobnienie/ zmiaczenie tabletek i podanie pod język lub rozpuszczenie w niewielkiej ilości wody i podanie łyżeczką.

Wskazania do stosowania:

Wspomagająco w celu łagodzenia objawów infekcji grypowych przebiegających z bólami głowy, bólami mięśniowymi, kostnowstawowymi, gorączką (do 38,5°C), dreszczami i uczuciem ogólnego rozbicia.

Przeciwwskazania:

Leku Paragrippe nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane:

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych w czasie stosowania produktu homeopatycznego należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39 st.C, duszności, uporczywego kaszlu lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Lek zawiera w swoim składzie sacharozę i laktozę.

W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Zawiera sacharozę i laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem preparatu.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczających danych. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać poniżej 25st.C.

Podmiot odpowiedzialny Boiron