

Pasta cynkowa z kwasem salicylowym, maść, 20 g



Cena: 4,71 zł

Opis słownikowy

Postać	Maść
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Pasta Lassara to lek o słabym działaniu przeciwbakteryjnym oraz wysuszający. Lek ma postać pasty cynkowej z kwasem salicylowym i stosuje się go jako środek pomocniczy przy małych skórnych wykwitach trądziku młodzieńczego. Produkt leczniczy jest przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Działanie: Pasta cynkowa na skórę z kwasem salicylowym.

Skład: Tlenek cynku 25g, kwas salicylowy 2g, skrobia pszeniczna, wazelina biała.

Wskazania:

Lek wskazany jest do stosowania w przypadku niewielkich zmian skórnych, trądziku i otarciach naskórka.

Właściwości:

Do stosowania na skórę. Jest lekiem wysuszającym, ściągającym i przeciwbakteryjnym.

Sposób użycia:

Lek stosuje się na skórę. Niewielką ilość maści smarować 1-2 razy dziennie zmienione chorobowo

miejsca na skórze.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku: w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku, w ostrych stanach zapalnych skóry, w obrębie skóry owłosionej, na rany i owrzodzenia. Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu z oczami. Osoby z astmą oskrzelową powinny przed zastosowaniem leku zasięgnąć opinii lekarza.

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Substancja czynna:

Acidum salicylicum, Zinci oxidum

Podmiot odpowiedzialny:

PPF HASCO-LEK S.A.