

Potasu nadmanganian, proszek do sporządzania roztworu, 1 sasz. po 5 g

Cena: 6,76 zł



Opis słownikowy

Postać	Proszek
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

POTASU NADMANGANIAN HASCO proszek do sporządzania roztworu zewnętrznego 5 g
Kalii permanganas

Nadmanganian potasu jest bardzo silnym utleniaczem, który w kontakcie z patogennymi drobnoustrojami neutralizuje je, a nawet niszczy. Drobne kryształki dobrze rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwór przeznaczony do przemywania i pędzlowania owrzodzonej skóry lub trudno gojących się, ropiejących ran. W mniejszych stężeniach służy jako płukanka do jamy ustnej, szczególnie zalecana po zabiegach i operacjach stomatologicznych.

Potasu Nadmanganian Hasco - wskazania

Przemywanie:

- owrzodzonej skóry;
- ropiejących ran;
- jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na nadmanganian potasu lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Wiek poniżej 18. roku życia.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

Preparat do stosowania miejscowego.

Przemywanie skóry (stężenie do 1%)

Kilkanaście kryształków substancji rozpuścić w 1 szklance wody. Roztwór powinien być purpurowy.

Płukanie jamy ustnej i gardła (stężenie 0,02-0,1%)

Kilka kryształków substancji rozpuścić w 1 szklance wody. Roztwór powinien być lekko różowy.

Nie przekraczać zalecanych dawek.

Stosować wyłącznie świeżo przygotowane roztwory.

Jeśli po kilku dniach objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu, należy zgłosić się do lekarza.

Działania niepożądane:

Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z jego potencjalnymi interakcjami z innymi substancjami czynnymi.

Lek może powodować efekty niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Czasem pojawia się brązowe zabarwienie skóry. Zastosowanie zbyt dużych stężeń skutkuje zaczerwienieniem i wysuszeniem naskórka.

Ostrzeżenia:

- Przechowywać z dala od substancji łatwopalnych.
- Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku jako płukanki do ust

Inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować