

Prontosan acute żel na rany, 30g

Cena: 42,19 zł



Opis słownikowy

Postać	Żel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	BRAUN
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Prontosan acute żel przeznaczony do pielęgnacji ran i lekkich oparzeń.

Właściwości:

- oczyszcza, schładza, nawilża, i odkażania ran, takich jak: urazowe, pooperacyjne (miejsce operowane - ZUM), oparzenia termiczne i chemiczne
- zmniejsza ból
- zapobiega infekcji ran
- Ułatwia bezbolesną zmianę opatrunku
- Stabilizuje pH rany
- Autolityczne oczyszczanie ran

Sposób użycia:

Żel należy nałożyć (bez wcierania) na ranę raz lub dwa razy dziennie. W razie potrzeby osłonić odpowiednim opatrunkiem.

Skład:

Woda oczyszczona, glicerol, hydroksyetyloceluloza, substancja powierzchniowo czynna betaina, 0,1% biguanidyna poliaminopropylu (poliheksanidyna).

Stosowanie wyrobu z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

W przypadku dzieci produkt stosować można wyłącznie pod kontrolą dorosłych.

Przeciwwskazania:

Nie stosować żelu na rany zainfekowane lub obficie sączące. Prontosan acute żel na rany nie należy stosować u pacjentów, u których stwierdzono uczulenie, lub kiedy istnieje podejrzenie, że pacjent może być uczulony na jakikolwiek składnik produktu. Żelu nie należy stosować w uchu środkowym lub wewnętrznym ani w oku. W przypadku kontaktu Prontosan acute żel na rany z oczami należy przemyć oczy dużą ilością bieżącej wody i skonsultować się z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jeżeli nie podano inaczej, środki farmaceutyczne należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, tj. od 15 do 25 st.C.