

PULMAC-600, 10 tabletki musujące

Cena: 13,10 zł



Opis słownikowy

Postać	Tabletki musujące
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	S-LAB
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Suplementy diety

Opis produktu

PULMAC-600 tabletki musujące 10szt

Acetylocysteina 600 mg, Laktoferyna 50 mg, Cynk 15 mg, Selen 100 µg produkt przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży od 14 roku życia zawierający unikalne połączenie acetylocysteiny, laktoferyny, cynku i selenu. Cynk i selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Składniki:

Acetylocysteina, laktoferyna (mleko i produkty pochodne), cynk (cytrynian cynku), selen (selenian sodu), regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglan sodu, substancja wiążąca: sorbitol, glikol polietylenowy, naturalny aromat: koncentrat buraka czerwonego, koncentrat czarnej marchwi, koncentrat soku z owoców leśnych (jagoda, malina), substancja słodząca: sukraloza. Produkt o smaku owoców leśnych, bez cukru.

Składniki:

- pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (cynk, selen)
- pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym (cynk, selen)

Sposób użycia:

Dorośli i młodzież od 14 roku życia: 1 tabletkę musującą dziennie po posiłku, nie później niż 4 godziny przed snem. Tabletkę należy rozpuścić w ok. 200 ml ciepłej wody i spożyć bezpośrednio po rozpuszczeniu.

UWAGA: Tworząca się piana, jest naturalnie występującym efektem wynikającym z obecności laktoferyny.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
- Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.
- Ostry stan astmatyczny.
- Zmniejszona zdolność odkrztuszania wydzieliny.
- Ciąża i okres karmienia piersią.

Ostrzeżenia:

- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety .

- Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Zaleca się zdrowy tryb życia oraz stosowanie zbilansowanej diety.
- Produkt zawiera substancję słodzącą. Spożycie w dawce wyższej niż zalecana dawka dzienna, może mieć efekt przeczyszczający.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu przydatności do użycia.

Sposób przechowywania:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze 0-25°C.