

## Ranigast S-O-S Mleczko, 200 ml



Cena: 19,92 zł

### Opis słownikowy

Postać	Mleczko
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

**Ranigast S-O-S MLECZKO** to zawiesina doustna, która łagodzi objawy refluksu żołądkowo-przełykowego, jednocześnie chroniąc śluzówkę żołądka. Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz, w razie konieczności dla młodzieży i dzieci powyżej 6 roku życia.

### Skład

Alginian sodu, węglan wapnia, wodorowęglan potasu, wyciąg z imbiru (aromat), olejek eteryczny z imbiru (aromat), aromaty anyżu i mleka, woda, karbomer, parahydroksybenzoesan metylowo-sodowy, sukraloza.

### Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera 200 ml zawiesiny.

### Działanie

Zawarty w składzie alginian sodu pęcznieje pod wpływem kwasu żołądkowego i w formie żelu tworzy warstwę ochronną powlekającą błonę śluzową żołądka. Wodorowęglan potasu oraz węglanu wapnia sprawiają natomiast, że **Ranigast S-O-S MLECZKO** neutralizuje kwasotę soku żołądkowego. Wydzielające się w trakcie tej reakcji pęcherzyki dwutlenku węgla zostają uwięzione w żelu alginianowym co przekształca go w unoszącą się na powierzchni soku żołądkowego piankę, która stanowi barierę zmniejszającą liczbę epizodów refluksu.

## Wskazania

Produkt wskazany jest do stosowania w celu zmniejszenia dolegliwości związanych z refluksem żołądkowo-przełykowym oraz w celu łagodzenia nadkwaśności.

## Stosowanie produktu

Produkt należy przyjmować po dwóch głównych posiłkach oraz przed snem i stosować aż do ustąpienia objawów. Zaleca się aby **osoby dorosłe i młodzież powyżej 12 roku życia** przyjmowali po 1 łyżce stołowej zawiesiny (około 15 ml). **Dzieciom w wieku 9-12 lat** zaleca się podawać 2 łyżeczki zawiesiny (około 10 ml), natomiast **dzieciom w wieku 6-9 lat** podawać należy po 1 łyżeczce zawiesiny (około 5 ml).

Jeśli po miesiącu stosowania objawy nadal się utrzymują, należy skontaktować się z lekarzem.

## Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Nie stosować w przypadku przewlekłych zaparć lub biegunki, choroby nerek oraz przewlekłej niewydolności serca.

Nie stosować dłużej niż 30 dni.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub nietolerancji na którykolwiek ze składników.

## Uwagi i środki ostrożności

Wyrób należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w suchym miejscu, które jest niedostępne dla dzieci.

Chronić przed bezpośrednimi źródłami światła lub ciepła.

Nie używać jeśli opakowanie uległo zniszczeniu, nie dopuszczać do przedostania się produktu ani jego opakowania do środowiska.

## Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego

Po zastosowaniu wyrobu mogą wystąpić zaparcia oraz przemijające nudności.

Jeśli objawy będą się utrzymywać, należy zgłosić się do lekarza.

## Stosowanie wyrobu z innymi lekami

Wszelkie leki podawane doustnie i suplementy diety należy przyjmować minimum 2 godziny przed lub po zastosowaniu wyrobu medycznego **Ranigast S-O-S MLECZKO**.

Jeśli pacjentka stosuje leki antykoncepcyjne przed użyciem zawiesiny doustnej powinna

skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie wyrobu medycznego jest przeciwwskazaniem do zażywania takich produktów leczniczych jak: omeprazol, cymetydyna lub cizapryd. W przypadku przyjmowania tych leków należy skonsultować się z lekarzem.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Kobiety ciężarne i karmiące piersią przed przyjęciem produktu powinny skonsultować się z lekarzem.

### **Stosowanie u dzieci i młodzieży**

Produkt dozwolony jest do stosowania u młodzieży i dzieci powyżej 6 roku życia, jednak może on być podany tylko jeśli jest to bezwzględnie konieczne i po konsultacji z lekarzem.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady farmaceutyczne Polpharma S. A.  
Peplińska 19  
83-200 Starogard Gdański