

# Regevagia, globulki dopochwowe, 10 glob.

Cena: 25,78 zł



## Opis słownikowy

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Postać                                   | Globulki                            |
| Producent /<br>Podmiot<br>Odpowiedzialny | AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O. |
| Przechowywanie                           | Temperatura pokojowa                |
| Rejestracja                              | Wyrób medyczny                      |

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

#### Zastosowanie:

Wyrób medyczny Regevagia poprzez wytworzenie warstwy powlekającej błonę śluzową pochwy stwarza warunki sprzyjające przywracaniu prawidłowego stanu nabłonka. Wyrób medyczny poprawia nawilżenie oraz wspomaga proces regeneracji tkanek. Dzięki swoim właściwościom Regevagia łagodzi stany zapalne, uczucie suchości i dyskomfortu.

Dodatkowo zawarty w wyrobie kwas mlekowy wpływa na utrzymanie fizjologicznego poziomu pH, co zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji.

#### Cechy:

- likwiduje suchość błony śluzowej pochwy
- regeneruje nabłonek pochwy
- utrzymuje fizjologiczne pH

#### Składniki:

glicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych  
eter cetostearylowy makrogolu  
wyciąg olejowy z kwiatów malwy  
hialuronian sodu  
masło aloesowe  
kwas mlekowy  
mleczan sodu  
laktoza jednowodna

### **Przygotowanie i stosowanie**

Sposób postępowania z wyrobem: Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Regevagia należy przeczytać uważnie całą ulotkę z instrukcją użycia, ponieważ zawiera ona ważne informacje..

Tylko do stosowania dopochwowego.

Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilą się w trakcie stosowania Regevagina lub będą się utrzymywać powyżej 7-10 dni.

Przed aplikacją dokładnie umyć dłonie.

*Kuracja podstawowa:* Stosować 1 globulkę dopochwową raz dziennie (na noc) przez 7 dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Globulkę należy umieścić głęboko w pochwie.

*Kuracja podtrzymująca:* Stosować 1 globulkę dopochwową co 2-3 dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Globulkę należy umieścić głęboko w pochwie.

### **Przechowywanie**

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.

### **Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:**

Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności: Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. Nie stosować w trakcie menstruacji. Wyrób medyczny Regevagia nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi preparatami do stosowania dopochwowego. Nie stosować łącznie z lateksowymi prezerwatywami lub wkładkami antykoncepcyjnymi. Stosowanie wyrobu z lekami miejscowo znieczulającymi może wydłużyć okres znieczulenia. W przypadku ostrej infekcji pochwy należy zasięgnąć porady lekarza. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

Możliwe działania niepożądane: W przypadku wystąpienia objawów słabego działania drażniącego, świądu, pieczenia, wysypki lub innych objawów nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania wyrobu i zasięgnąć porady lekarza.

### **Producent**

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.  
ul. Partyzancka 133/151  
95-200 Pabianice