

Roztwór wodny jodu, roztwór na skórę, roztwór do płukania jamy ustnej, 40 g



Cena: 8,60 zł

Opis słownikowy

Postać	Roztwór
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne COEL S.J. E.Z.M. Konstany
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Iodi

Syn: PŁYN LUGOLA

Roztwór na skórę, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 1%

Skład:

1 g płynu zawiera:
Substancje czynne
– jod 10 mg,
– jodek potasu 20 mg.

Wskazania do stosowania:

Zewnętrznie do odkażania skóry, przemywania drobnych zranień i otarć. Po rozcieńczeniu wodą stosuje się do płukania gardła; po rozcieńczeniu gliceryną do pędzlowania migdałków.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować przy nadwrażliwości na jod, nadczynności tarczycy, gruźlicy płuc, zapaleniu opryszczkowym skóry (choroba Duhringa).

Nie należy stosować u noworodków i niemowląt.

Interakcje:

Może zaburzać badania czynnościowe tarczycy. Nie należy stosować ze związkami rtęci.

Działania niepożądane:

U osób nadwrażliwych na jod może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy nosowo – gardłowej i wysypka.

Stosowanie podczas ciąży i laktacji:

Zewnętrznie stosować ostrożnie w przypadku przerwania ciągłości skóry. W okresie karmienia dziecka piersią, przed zastosowaniem leku, należy zasięgnąć opinii lekarza. Nie stosować leku doustnie w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem:

Stosowanie preparatu wewnętrznie możliwe jest tylko po konsultacji z lekarzem lub na zlecenie służb sanitarnych.

Ostrzeżenia:

Podany doustnie hamuje czynność tarczycy.

Sposób stosowania i droga podania:

Zewnętrznie, jako środek antyseptyczny na skórę, roztwór nie rozcieńczony.

Do płukania gardła: 10 kropli roztworu na szklanę (200 ml) wody.

Do usuwania nalotu z migdałków: 10 kropli na kieliszek (50 ml) gliceryny.

Doustnie wyłącznie w dawkach indywidualnie uzgodnionych z lekarzem. Należy rozpuścić zalecaną ilość preparatu w szklance wody, mleka lub soku aby uniknąć podrażnienia żołądka.

Przechowywać w opakowaniu zamkniętym, chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Pozwolenie nr IL-4475/ChF.