

# Scholl Fungal Nail TreatMent, 3,8 ml



Cena: 46,01 zł

## Opis słownikowy

Postać	Płyn
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

#### **Właściwości:**

Do samodzielnej terapii w domu w celu leczenia łagodnych stanów grzybicy paznokcia. Zaawansowana formuła wnika w głąb paznokcia, niszcząc infekcję u źródeł jej powstania. Preparat pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji oraz chroni przed nawrotami zakażenia. Testowany dermatologicznie.

#### **Działanie**

Scholl preparat na grzybicę paznokci to unikalny preparat, którego skuteczność została potwierdzona naukowo. Preparat jest łatwy w użyciu i wydajny, a jego specjalnie opracowana formuła penetruje paznokcie by zniszczyć grzybicę paznokci w miejscu ich powstawania. Pięć pilniczków jednorazowego użytku łagodnie usuwa wierzchnią warstwę zainfekowanego paznokcia. Preparat pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji oraz chroni przed nawrotami zakażenia.

Leczenie przebiega w dwóch etapach:

Faza 1 - etap leczniczy (4 tygodnie) - w tej fazie niszczone są grzyby powodujące grzybicę paznokci.

Faza 2 - etap ochronny (9 miesięcy) - faza druga ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji i chronić przed nawrotami zakażenia.

#### **Wskazania**

Scholl preparat na grzybicę paznokci jest odpowiedni dla łagodnych stanów grzybicy paznokci.

Łagodne stany grzybicy paznokci występują gdy:

- objawy nie utrzymują się dłużej niż dwa lata,

- przebarwienia nie występują na całej płytce paznokcia,
- objawy pojawiają się na najwyżej dwóch paznokciach.

### Sposób użycia wyrobu medycznego

#### Faza 1 - etap leczniczy (4 tygodnie)

- Wyjmij jeden pilnik.
- Delikatnie spiłuj powierzchnię zainfekowanego paznokcia.
- Po użyciu wyrzuć pilnik, aby nie rozprzestrzenić zakażenia.
- Nałóż pędzelkiem preparat przeciwgrzybiczy.
- Stosuj preparat raz dziennie, przez 7 dni.
- Powtórz całą procedurę na początku 2., 3. i 4. tygodnia.

#### Faza 2 - etap ochronny (9 miesięcy)

Nakładaj preparat pędzelkiem na zainfekowane paznokcie raz w tygodniu przez okres 9 miesięcy (lub do czasu odrośnięcia zdrowego paznokcia).

### Przeciwwskazania i środki ostrożności

- Nie stosować na otwarte rany ani na uszkodzoną lub podrażnioną skórę, a także w przypadku jakichkolwiek innych schorzeń stóp.
- Unikać kontaktu z oczami i skórą.
- Przerwać stosowanie, jeśli wystąpi podrażnienie.
- Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji nigdy nie stosuj tego samego pilniczka dwa razy.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

### Uwagi

Diabetycy oraz osoby z problemem słabego krążenia krwi, przed użyciem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem, ponieważ ich stopy mogą wymagać profesjonalnej opieki medycznej.

### Podmiot odpowiedzialny

RECKITT BENCKISER (Poland) S.A.  
Okunin 1  
Nowy Dwór Mazowiecki