

SmectaGo, zawiesina doustna, 8 sasz.

Cena: 14,18 zł



Opis słownikowy

Postać	Saszetki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	IPSEN POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis produktu

Smecta Go to wyrób medyczny w saszetkach z zawiesiną gotową do wypicia.

- Hamuje biegunkę,
- Łagodzi ból brzucha,
- Usuwa substancje toksyczne.

Głównym składnikiem SmectaGo® jest diosmektyt. Diosmektyt jest naturalną gliną, która pomaga w zahamowaniu i leczeniu biegunki oraz w łagodzeniu bólu brzucha.

Wykazano, że diosmektyt:

- wiąże substancje toksyczne i drobnoustroje (bakterie i wirusy) oraz ułatwia ich eliminację z organizmu;
- dzięki swoim naturalnym właściwościom powlekającym ochrania przewód pokarmowy oraz wspomaga regenerację jego uszkodzeń.

Skuteczność diosmektytu została potwierdzona w badaniach klinicznych.

Wyrób medyczny SmectaGo® jest przeznaczony do stosowania w:

- leczeniu ostrej biegunki u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 8 lat. W przypadku stosowania u dzieci z ostrą biegunką konieczne jest jednoczesne podawanie doustnego płynu nawadniającego
- leczeniu przewlekłej biegunki lub bólu brzucha u dorosłych.

Sposób podawania:

Ten gotowy do wypicia wyrób medyczny należy przyjmować doustnie.

Zawartość może zostać przyjęta bezpośrednio z saszetki.

Saszetkę przed otwarciem należy lekko ugnieść.

Każda saszetka po otwarciu powinna być przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku.

Dzięki saszetce GOTOWEJ DO SPOŻYCIA można:

- wszędzie ją ze sobą zabrać,
- zażyć produkt, jak tylko pojawi się problem,
- przyjąć dyskretnie w każdym miejscu,
- wypić zawiesinę prosto z saszetki bez konieczności,
- rozrabiania w wodzie lub popijania.

Dawkowanie:Ostra biegunka:

Dzieci (8 do 15 lat włącznie): Początkowa dawka to 2 saszetki, następnie 1 saszetka po każdym wolnym stolcu, maksymalnie do 4 saszetek na dobę. Należy stosować doustny płyn nawadniający (DPN) w celu uzupełnienia płynów utraconych z powodu biegunki oraz zapobiegania odwodnieniu.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat: Początkowa dawka to 2 saszetki, następnie 1 saszetka po każdym wolnym stolcu, maksymalnie do 6 saszetek na dobę. SmectaGo® można stosować przez okres do 3 dni. Jeżeli biegunka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, należy zgłosić się do lekarza.

Przewlekła biegunka lub ból brzucha:

Dorośli (wyłącznie) Do 3 saszetek na dobę. Bez konsultacji z lekarzem, leczenie nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. Nie zaleca się długotrwałego ani wielokrotnego stosowania SmectaGo®.

Nie stosować w przypadku uczulenia na diosmektyt lub którykolwiek z pozostałych składników tego wyrobu, u dzieci poniżej 8 lat z ostrą biegunką; u dzieci z przewlekłą biegunką lub bólem brzucha.

Najczęściej zgłaszane w trakcie leczenia działania niepożądane to zaparcia. W przypadku wystąpienia zaparcia, należy przerwać stosowanie wyrobu. W razie potrzeby można wznowić przyjmowanie wyrobu, stosując mniejsze dawki dobowe. Inne, rzadziej zgłaszane działania niepożądane to: wysypka, pokrzywka, świąd (swędzenie) oraz obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry, warg, gardła i języka).

Wytwórca:

Ipsen Consumer HealthCare

Lokalny przedstawiciel:

Ipsen Poland Sp. z o.o., ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, tel.: 22 653 68 00.